

## **Состав**

*действующее вещество:* бузины черной цветки (*Sambuci nigrae flores*);

1 фильтр-пакет содержит бузины черной цветков (*Sambuci nigrae flores*) 1,5 г.

## **Лекарственная форма**

Цветки.

*Основные физико-химические свойства: цельная сырье:* отдельные цветки и бутоны на коротких голых цветоножках или без них с примесью веточек, соцветий и листьев. Цвет желтый;

*порошок крупный:* смесь измельченных кусочков цветков и бутонов с примесью цветоножек, веточек и листьев различной формы. Цвет желтый с буроватыми вкраплениями.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05X.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества препарата оказывают потогонное, противовоспалительное, обезболивающее, мочегонное и мягкое отхаркивающее действие.

## **Показания**

Грипп, воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхиты, трахеиты, ларингиты), почек и мочевого пузыря - в составе комплексной терапии.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

## **Способ применения и дозы**

1 фильтр-пакет поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл ( $\frac{1}{2}$  стакана) кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Взрослым и детям старше 16 лет принимать в теплом виде по  $\frac{1}{2}$  стакана 3 раза в день после еды. Детям 3-7 лет - по 2 десертные ложки 3 раза в день после еды 7-12 лет - по 2 столовые ложки 3 раза в день после еды 12-16 лет - по  $\frac{1}{3}$  стакана 3 раза в день после еды.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

## **Дети**

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет по назначению врача.

## **Передозировка**

Сообщения отсутствуют.

## **Побочные реакции**

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). При возникновении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 1,5 г в фильтр-пакете № 20 в пачке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ПрАО «Лектравы».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., Г.. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.