

Состав

действующие вещества: 100 г каплей содержат 29 г водно-спиртового экстракта (экстрагент этанол 59% (об / об)) из лекарственных растений:

корня алтея (Radix Althaeae)	0,4 г;
цветов ромашки (Flores Chamomillae)	0,3 г;
травы хвоща (Herba Equiseti)	0,5 г;
листья грецкого ореха (Folia Juglandis)	0,4 г;
травы тысячелистника (Herba Millefolii)	0,4 г;
коры дуба (Cortex Quercus)	0,2 г;
травы одуванчика (Herba Taraxaci)	0,4 г;

вспомогательные вещества: этанол 19% (об / об), вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная или слегка мутная жидкость желто-коричневого цвета с запахом ромашки. В процессе хранения возможно помутнение и выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТС R05X.

Компоненты, входящие в состав растительного лекарственного средства, имеют комплексную активность.

Имупрет® благодаря полисахаридам ромашки и алтея стимулирует неспецифическую реакцию иммунной системы за счет повышения фагоцитоза макрофагов и гранулоцитов. Эти активные компоненты также повышают внутриклеточное разрушение бактерий в процессе фагоцитоза вследствие повышения выделения активных метаболитов кислорода, обладают бактерицидным свойством. Полисахариды, эфирные масла и флавоноиды (ромашки, алтея и тысячелистника) уменьшают отек слизистой оболочки при

инфекции дыхательных путей. Исследования in vitro показали, что кора дуба, которая содержит много танинов, проявляет противовирусное эффект также к вирусу гриппа.

Хвощ, входящий в состав препарата, усиливает эти эффекты благодаря его хорошо известным целебным и профилактическим свойствам.

Показания

Для лечения заболеваний верхних дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, ларингит). Профилактика осложнений и рецидивов при респираторных вирусных инфекциях вследствие снижения защитных сил организма.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любой из действующих или вспомогательных веществ препарата и к растениям семейства сложноцветных.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не наблюдалось.

Препараты, содержащие кору дуба, могут ослабить или блокировать всасывание алкалоидов и других щелочных лекарственных средств при одновременном применении.

Особенности применения

Надлежащие меры безопасности при применении

Это лекарственное средство содержит этанол 19% (об / об).

Из-за содержания этанола капли Имупрет® не следует назначать после успешного антиалкогольного лечения. Пациенты с заболеваниями печени, эпилепсией, черепно-мозговыми травмами могут принимать этот препарат только после консультации с врачом.

Во время хранения препарата возможно его помутнение или выпадение осадка, однако это не влияет на действие препарата.

Если симптомы заболевания не исчезают после 1 недели лечения или возникла одышка, лихорадка, гнойные или кровавые мокроты, следует обратиться к врачу.

Примечание для больных сахарным диабетом. Разовая доза содержит незначительное количество хлебных единиц (ХЕ).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Сведений о непосредственном влиянии препарата на способность управлять автотранспортом или другими механизмами нет, но следует иметь в виду, что препарат содержит этанол.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не рекомендуется для применения во время беременности.

Способ применения и дозы

Если не назначено иначе, препарат применяют в следующих дозах:

Возраст	Дозирование при острых проявлениях	Дозирования после спада острых проявлений и для профилактической терапии
Дети в возрасте 1 год	по 5 капель 5-6 раз в сутки	по 5 капель 3 раза в сутки
Дети в возрасте от 2 до 5 лет	по 10 капель 5-6 раз в сутки	по 10 капель 3 раза в сутки
Дети в возрасте от 6 до 11 лет	по 15 капель 5-6 раз в сутки	3 раза в сутки

Взрослые и дети старше 12 лет	по 25 капель 5-6 раз в сутки	по 25 капель 3 раза в сутки
--	------------------------------------	--------------------------------

Перед применением раствор следует взболтать. Флакон при накапывании препарата следует держать вертикально. Капли принимают, как правило, в неразбавленном виде. Указанное количество капель необходимо подержать недолго во рту и потом проглотить. При необходимости капли можно применять с небольшим количеством воды. Детям можно давать капли, добавляя их в сок или чай.

Даже после исчезновения острых симптомов целесообразно еще в течение 1 недели продолжать лечение, чтобы предотвратить рецидив заболевания.

Препарат хорошо переносится, поэтому может быть рекомендован для длительного применения. Для базисной терапии хронических заболеваний дыхательных путей (особенно тонзиллита) препарат необходимо применять не менее 6 недель.

Дети

Не следует применять детям до 1 года.

Передозировка

Случаи отравления препаратом вследствие передозировки неизвестны.

Лечение: симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Редко: могут возникать желудочно-кишечные расстройства (например боль в животе, тошнота, рвота). Также могут возникать аллергические реакции (например сыпь, зуд, одышка).

При применении в сочетании с препаратами, содержащими цветы ромашки могут возникать аллергические реакции, а также у больных с повышенной чувствительностью к другим растениям семейства сложноцветных (например тысячелистник (*Achillea Millefolium*)).

При возникновении каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Открытый флакон пригоден к применению в течение 6 месяцев.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл во флаконе в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Бионорика СЕ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

11-15, 92318, г. Ноймаркт, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).