

## **Состав**

*действующее вещество:* натрия (sodium citrate)

1 саше (5,6 г гранул) содержит натрия цитрата 4 г

*вспомогательные вещества:* сахароза, сахарин натрия, вкусовая добавка клюква 191121.

## **Лекарственная форма**

Гранулы.

*Основные физико-химические свойства:* белые или почти белые сыпучие гранулы с приятным запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые в урологии. Код АТХ G04B X.

## **Фармакодинамика**

Натрия цитрат метаболизируется в бикарбонат, который способствует регрессии дизурии, что наблюдается при цистите, уменьшает кислотность мочи, вызывая подщелачивание.

## **Фармакокинетика**

Фармакокинетика натрия цитрата соответствует его естественной фармакокинетике в организме.

## **Показания**

Облегчение симптомов цистита у женщин.

## **Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата;
- сахарный диабет;
- заболевания сердца;
- артериальная гипертензия;

- заболевания почек;
- пребывание на низкосолевой диете;
- беременность, кормление грудью.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Следует избегать совместного применения препаратов, содержащих натрий, больным, получающим препараты лития, поскольку натрий преимущественно абсорбируется почками, что приводит к увеличению экскреции лития и снижению его уровня в плазме крови.

Не следует одновременно использовать препараты, способствующие задержке мочи, в частности цитрат натрия, с уротропином, поскольку он эффективен только в кислой моче.

Терапевтический эффект ряда лекарственных средств может быть уменьшен или увеличен при задержке мочи или снижении рН желудочного сока, которые возникают в результате действия цитрата натрия.

## **Особенности применения**

Если симптомы сохраняются после двух дней лечения, необходимо обратиться к врачу. Превышать рекомендуемую дозу.

Вспомогательные вещества. Препарат содержит сахарозу. Если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Это лекарственное средство содержит 40,8 ммоль (939 мг) / доза натрия. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, применяют натрий-контролируемую диету.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не установлено.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано в период беременности и кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

## Женщины (взрослые)

Содержимое саше растворить в 1 стакане воды.

Принимать внутрь по 1 саше 3 раза в сутки в течение 48 часов.

Приготовленный раствор необходимо использовать сразу.

## Мужчины и дети

Не рекомендуется.

## **Дети**

Не рекомендуется.

## **Передозировка**

Передозировка препаратом маловероятно.

*Симптомы:* в случае чрезмерного употребления цитрата натрия могут возникнуть ощущение желудочно-кишечного дискомфорта и диарея.

Передозировка солями натрия может привести к гипернатриемии и гиперосмолярности. Чрезмерное употребление бикарбонатов может привести к гипокалиемии и метаболическому алкалозу, особенно у пациентов с нарушенной функцией почек.

*Лечение:* симптоматическое, включая соответствующую коррекцию водно-электролитного баланса.

## **Побочные реакции**

*Со стороны иммунной системы:* реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания.

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* боли в животе.

*Со стороны почек и мочевыделительной системы:* умеренное усиление диуреза.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 ° С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 5,6 г гранул в саше. По 6 саше в картонной упаковке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Кусум Хелтхкер ПБТ Лтд.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Плот № М-3, Индор Спешел Икономик Зоун, Фейз-II, Питампур, достать. Дхар, Мадхья Прадеш, Пин 454774, Индия.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).