

Состав

действующее вещество: 1 капсула содержит 200 мг гибискуса экстракта сухого (hibisci extractum siccum);

вспомогательные вещества: лактоза, повидон;

состав твердой желатиновой капсулы: желатин, титана диоксид (Е 171), тартразин (Е 102), амарант (Е 123), эритрозин (Е 127), патентованный синий V (Е 131).

Лекарственная форма

Капсулы.

Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы с крышечкой и корпусом бордового цвета, содержащие порошок пурпурно-фиолетового цвета с белыми вкраплениями. Допускается наличие спрессованных столбиков или комочков, которые распадаются при надавливании.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в урологии. Код АТХ G04В Х.

Фармакодинамика

Патентованный экстракт гибискуса является источником органических кислот (лимонная, оксibuрштинова, пирокатехиновой, гибискова), витаминов, полисахаридов, биофлавоноидов, которые обуславливают бактериостатический эффект лекарственного средства Афлазин® по большинству возбудителей инфекций мочевыводящих путей (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Enterobacter* spp. *Candida* spp.). Он обладает противовоспалительными, противоотечными свойствами, проявляет антиадгезивный эффект, что делает невозможным адгезию (прилипание) микроорганизмов к стенкам мочевыводящих путей, их развитие и размножение. Предотвращает развитие дизурических явлений.

Фармакокинетика

Не изучали.

Показания

В составе комплексной терапии при острых и хронических инфекциях мочевого пузыря (цистит) и почек (пиелонефрит), при бессимптомные бактериурии, в том числе у беременных женщин.

Хронические неинфекционные заболевания почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит), профилактика инфекций мочевыводящих путей, в том числе после инструментальных вмешательств (эндоскопические, рентгенологические и гинекологические исследования).

Профилактика образования мочевых камней, в том числе после их удаления.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. Афлазин® можно применять в сочетании с антибиотиками и другими антимикробными средствами.

Особенности применения

Поскольку препарат содержит лактозу, его не следует применять пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата в I триместре беременности возможно только по назначению врача. Применение препарата в период беременности начиная со II триместра, а также в период кормления грудью не требует дополнительной консультации врача.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет применять по 1 капсуле 2 раза в сутки независимо от приема пищи. Детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 1 капсуле 1 раз в сутки. Длительность применения устанавливается индивидуально в зависимости от тяжести заболевания. Рекомендуемая продолжительность применения при острых воспалениях мочевыводящих путей и обострении хронических заболеваний составляет 4-6 недель. Рекомендуемый курс применения с профилактической целью составляет 2-4 недели.

Дети

Препарат можно применять детям в возрасте от 6 лет.

Передозировка

Случаи отравления препаратом вследствие передозировки неизвестны.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 капсул в блистере, 3 блистера в упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ВАЛАРТИН ФАРМА».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 08135, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Чайки, ул. Грушевского, 60.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).