

Состав

действующее вещество: сухой экстракт травы золотарника обыкновенного;

1 таблетка содержит сухого экстракта травы золотарника обыкновенного (Extractum Herbae Solidaginis virgaureae siccum) (5-7:1) (экстрагент - этанол 60%) 300 мг;

вспомогательные вещества: магния стеарат, кросповидон, кремния диоксид, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: двояковыпуклые продолговатые таблетки от серо-зеленого до зеленовато-коричневого цвета с возможной мраморностью поверхности, с насечкой для деления с одной стороны.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, используемые в урологии. Различные средства, включая комбинации. Код АТХ G04ВХ.

Фармакодинамика

Трава золотарника обыкновенного содержит тритерпенсапонин, флавоноиды, лейкокарпозид, виргауреозид и другие активные компоненты. Экстракта золотарника обычного присуща комплексное воздействие: он обладает противовоспалительными свойствами, характеризуется диуретическим (акваретическим) действием и спазмолитическим действием на гладкую мускулатуру мочевыводящих путей. В то же время экстракт золотарника оказывает антибактериальное действие, в том числе по *Staphylococcus aureus*, *St. epidermidis*, *St. Faecalis*, *E.coli*, *Bacillus subtilis* и других. Активные вещества экстракта тормозят рост ряда грибов: *C. albicans*, *C. Krusei*, *C. Tropicalis* и другие.

Предотвращает камнеобразованию путем разбавления мочи и снижение концентрации в ней литогенных субстанций. Поскольку воспаление и сужение мочевыводящих путей связано с наличием мочевых камней, важное значение для вторичной профилактики приобретает также диуретическое и противовоспалительное действие золотарника. Итак, цисты-аурин является первоочередным средством при воспалительных и инфекционных заболеваниях

мочевыводящих путей, а также применяется для их профилактики.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Санация мочевыводящих путей при воспалительных процессах в составе комплексной терапии, при мочекаменной болезни и при наличии песка в почках
профилактика при мочекаменной болезни и при наличии песка в почках.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к золотарнику обычному или другим составляющим лекарственного средства.

Не рекомендуется применять при отеках, обусловленных сердечной или почечной недостаточностью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

При наличии крови в моче, при повышении температуры или отсутствии облегчения в течение 5 дней необходимо обратиться к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не следует применять препарат в период беременности и кормления грудью, поскольку такое применение исследованы недостаточно.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке 4-5 раз в сутки.

Таблетки принимают не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости (например, стаканом воды).

Курс лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания.

Дети

Из-за недостаточного количества данных исследований не рекомендуется применять препарат детям в возрасте до 12 лет.

Передозировка

На сегодня известно о интоксикации при приеме цист-аурину или других препаратов, содержащих траву золотарника обычного. Возможно усиление симптомов, указанных в разделе «Побочные реакции». При приеме избыточного количества препарата следует обратиться к врачу.

Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко (от $\geq 1/10000$ до $<1/1000$) наблюдались такие нарушения, как тошнота, рвота, диарея.

Со стороны иммунной системы: очень редко ($<1/10000$) - аллергические реакции (зуд, сыпь).

В случае появления любых нежелательных реакций следует прекратить лечение и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фарма Вернигероде ГмбХ, Германия.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Валленродер штр. 8-14, 13435 Берлин, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).