

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 таблетка содержит экстракта черной редьки сухого (*Raphani sativi nigri radicis*) (15 - 21: 1) с углем активированным (1: 1) 150 мг (экстрагент этанол 85%); экстракта травы артишока густого (*Cynarae herbae*) 47 мг (экстрагент этанол 50%); кислоты дегидрохолевой 40 мг масла, мяты перечной 15 мг;

*вспомогательные вещества:* сахароза, повидон, целлюлоза микрокристаллическая, гуммиарабик (E 414), кальция гидрофосфат дигидрат, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат, краситель Pigment Blend PB-277000: железа оксид черный (E172), титана диоксид (E 171 ).

## **Лекарственная форма**

Таблетки, покрытые оболочкой.

*Основные физико-химические свойства:* круглые двояковыпуклые с блестящей поверхностью, покрытые оболочкой черного цвета.

На изломе - черное ядро, окруженное белой и черной оболочкой.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при заболеваниях печени, желчевыводящих путей.

Препараты, применяемые при билиарной патологии.

Код АТХ А05А Х.

## **Фармакодинамика**

Комплексный препарат оказывает желчегонное действие и стимулирует желчеобразующую функцию печени. Препарат непосредственно влияет на печень, стимулирует секреторные функции и увеличивает количество желчи. Имеет защитное влияние на паренхиму печени, усиливает перистальтику кишечника, оказывает также спазмолитическое и мочегонное действия.

## **Показания**

Диспепсические явления, гипотоническая дискинезия желчного пузыря.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или к другим растениям семейства сложноцветных. Тяжелые заболевания печени, тяжелая

печеночная недостаточность, непроходимость (в т. ч. обструкция, стеноз) желчных путей, острые и хронические воспаления желудка и кишечника, желчнокаменная болезнь, эмпиема желчного пузыря.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

В высоких дозах с гипотензивными и мочегонными средствами может привести к гипокалиемии.

При одновременном применении с гипохолестеринемическими средствами усиливается эффект Рафахолина Ц.

### **Особенности применения**

Применять с осторожностью при заболеваниях, которые могут привести к непроходимости желчных путей.

Пациентам с желудочно-пищеводного рефлюкса (изжогой) следует избегать применения листьев мяты перечной, поскольку может увеличиться изжога.

Если симптомы заболевания не исчезают или постоянно рецидивируют, а такая же в случае возникновения диареи, боли в животе лечение следует прекратить и проконсультироваться с врачом.

Препарат не применять при острых заболеваниях почек.

Препарат содержит сахарозу, поэтому его не следует применять пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозы/галактозы и сахарозы/изомальтозы.

Больным сахарным диабетом следует учитывать, что препарат содержит сахарозу.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Безопасность использования в период беременности и кормления грудью не исследовалась, поэтому в этот период не рекомендуется применение препарата.

### **Способ применения и дозы**

Препарат предназначен для приема внутрь.

Детям старше 12 лет и взрослым назначают по 1 или 2 таблетки 3 раза в сутки

после еды.

При вздутии живота - взрослым по 2 таблетки утром и вечером, за полчаса до приема пищи.

## **Дети**

Клинических исследований по применению препарата детям до 12 лет не проводилось.

## **Передозировка**

*Симптомы:* рвота, понос, головная боль, покраснение лица, нарушение дыхания, нарушения сердечного ритма, тахикардия, возбуждение, мышечные сокращения, ощущение усталости, тошнота или усиление побочных эффектов.

*Лечение.* Отмена препарата. Лечение симптоматическое.

## **Побочные реакции**

*Со стороны пищеварительного тракта:* диарея/жидкий стул, желчная колика, дискомфорт в эпигастральной области, желудочно-пищеводный рефлюкс, изжога, тошнота.

*Со стороны иммунной системы:* аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, контактный дерматит).

При появлении аллергических реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 ° С в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 30 таблеток в блистере. По 1 блистеру в картонной упаковке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Вроцлавское Предприятие Лекарственных Трав «Гербаполь» АО.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

65/68, ул. Св. Николая 50-951 Вроцлав, Польша.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).