

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит Carduus D1 7,4 мг, Taraxacum D6 37,2 мг, Chelidonium D6

37,2 мг, Natrium sulfuricum D12 37,2 мг, Phosphorus D12 37,2 мг

вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые, плоские таблетки белого цвета с возможными вкраплениями, с распределительной чертой.

Свойства

Галстена® – восстанавливает, защищает, очищает печень, нормализует работу желчного пузыря предотвращает образование камней.

- Улучшает метаболические процессы в печени и способствует регенерации повреждений;
- Предупреждает и купирует развитие воспалительных процессов в печени, желчном пузыре и желчевыводящих путях;
- Улучшает детоксикационную функцию печени;
- Нормализует процесс желчеобразования и желчеотделения.

Фармакодинамика

Препарат Галстена сочетает свойства гепатопротектора, холеретика и холекинетика, оказывает спазмолитическое и противовоспалительное действие на гепатобилиарную систему.

Фармакокінетика

Не исследовалась.

Показания

- Острые и хронические заболевания печени и желчевыводящих путей;
- хронический панкреатит – в комплексном лечении;

- лечение острых и хронических заболеваний печени, желчевыводящих путей и пузыря;
- в комплексной терапии хронического панкреатита;
- для защиты и восстановления печени при применении антибиотиков, противогрибковых, болеутоляющих, противовоспалительных и других гепатотоксических препаратов и алкоголя.

Противопоказания

Повышенная чувствительность (аллергия) к любому из компонентов препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Клинически значимое взаимодействие препарата Галстена® с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными средствами и методами лечения.

Особенности применения

В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является преходящей. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата необходимо прекратить.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.

Поскольку Галстена® содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета р-ра, которое не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

1 таблетка Галстена® содержит 226,9 мг лактозы моногидрата, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Фертильность. Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Способ применения и дозы

Галстена® , таблетки:

взрослые и дети старше 12 лет — по 1 таблетке 2 раза в сутки;

дети в возрасте от 6 до 12 лет — по ½ таблетки 2 раза в сутки.

В начале лечения, а также в случаях, когда требуется быстрое устранение симптомов, возможен прием препарата до 4 раз в сутки. После улучшения состояния принимать 2 раза в сутки.

Для достижения максимального эффекта препарат Галстена®, таблетки рекомендуется принимать в промежутках между приемами пищи (за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи).

Таблетку рекомендуется держать во рту до полного растворения.

Если выраженность симптомов увеличивается или через 7 дней лечения не наблюдается улучшения, необходимо прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

При хроническом течении заболевания курс лечения может длиться до 4 нед.

Дети

Применять препарат Галстена®, таблетки, в возрасте от 6 лет.

В возрасте от 6 до 12 лет применяется по рекомендации врача.

Передозировка

Случаев передозировки не зарегистрировано.

Побочные реакции

В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью к любому из компонентов препарата возможны аллергические реакции. При появлении каких-либо побочных эффектов необходимо прекратить применение лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С.

Упаковка

По 12 таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Рихард Биттнер АГ.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).