

Состав

Carduus D1, Taraxacum D6, Chelidonium D6, Natrium sulfuricum D12.

Свойства

- Галстена® – восстанавливает, защищает, очищает печень, нормализует работу желчного пузыря предотвращает образование камней.
- Улучшает метаболические процессы в печени и способствует регенерации повреждений
- Предупреждает и купирует развитие воспалительных процессов в печени, желчном пузыре и желчевыводящих путях
- Улучшает детоксикационную функцию печени
- Нормализует процесс желчеобразования и желчеотделения

Фармакодинамика

Препарат Галстена сочетает свойства гепатопротектора, холеретика и холекинетика, оказывает спазмолитическое и противовоспалительное действие на гепатобилиарную систему.

Фармакокинетика

Не исследовалась.

Показания

Капли оральные:

- лечение острых и хронических заболеваний печени, желчевыводящих путей и пузыря;
- в комплексной терапии хронического панкреатита;
- для защиты и восстановления печени при применении антибиотиков, противопростудных, болеутоляющих, противовоспалительных и других гепатотоксических препаратов и алкоголя.

Противопоказания

Підвищена чутливість (алергія) до будь-якого з компонентів препарату.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Клинически значимое взаимодействие препарата Галстена® с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными средствами и методами лечения.

Особенности применения

В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является преходящей. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата необходимо прекратить.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.

Поскольку Галстена® содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета р-ра, которое не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Галстена®, капли оральные, не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью, поскольку одна доза (5/10 капель) содержит 80/160 мг спирта.

Содержание спирта следует учитывать также при применении препарата в период беременности, кормления грудью, у детей и пациентов с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Применение в период беременности или кормления грудью

В настоящее время отсутствуют доказательства существования особого риска применения лекарственного средства в период беременности или кормления грудью. Препарат следует применять с осторожностью в период беременности и кормления грудью и только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

Фертильность. Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

Способ применения и дозы

Галстена® , капли оральные:

взрослые и дети старше 12 лет — по 10 капель в чистом виде или развести в 1 столовой ложке воды;

дети, возраст 5-12 лет — по 5-7 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды;

дети, возраст 2-4 года — по 2-4 капли препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды.

Принимать препарат 3 раза в сутки.

В начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого уменьшения выраженности симптомов, рекомендован прием препарата каждые ½-1 ч до 8 раз в сутки до улучшения состояния, но не более 3 сут, после чего принимать 3 раза в сутки.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется принимать препарат Галстена®, капли оральные, в промежутках между приемами пищи (за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи), подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.

При увеличении выраженности симптомов, или в случае, если улучшения не наступает после 7 дней лечения, необходимо проконсультироваться с врачом.

Курс лечения в зависимости от характера и тяжести заболевания определяет врач.

Обычно продолжительность курса лечения: гепатит, гепатоз, цирроз печени — не менее 3 мес. Хронический холецистит, желчнокаменная болезнь, постхолецистэктомический синдром — 2-3 мес. При необходимости курс можно повторить через 1 мес. При дискинезии желчевыводящих путей продолжительность курса лечения — 2-3 нед. Для защиты клеток печени после антибиотикотерапии и других вредных воздействий — 2-4 нед.

Дети

Применять препарат Галстена®, таблетки, в возрасте от 6 лет.

В возрасте от 6 до 12 лет применяется по рекомендации врача.

Для лечения детей в возрасте от 2 до 6 лет можно применять препарат Галстена® в форме капель.

Применение препарата Галстена®, капли оральные, у детей до 2 лет не рекомендуется из-за недостатка данных.

Передозировка

Случаев передозировки не зарегистрировано.

Побочные реакции

В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью к любому из компонентов препарата возможны аллергические реакции. При появлении каких-либо побочных эффектов необходимо прекратить применение лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Капли оральные. В плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С.

Упаковка

По 50 мл во флаконах-капельницах из темного стекла, в картонной упаковке.

Производитель

Рихард Биттнер АГ, Австрия

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).