

## **Состав**

Carduus D1, Taraxacum D6, Chelidonium D6, Natrium sulfuricum D12, Phosphorus D12.

## **Свойства**

Галстена® – восстанавливает, защищает, очищает печень, нормализует работу желчного пузыря предотвращает образование камней.

- Улучшает метаболические процессы в печени и способствует регенерации повреждений;
- Предупреждает и купирует развитие воспалительных процессов в печени, желчном пузыре и желчевыводящих путях;
- Улучшает детоксикационную функцию печени;
- Нормализует процесс желчеобразования и желчеотделения.

## **Фармакодинамика**

Препарат Галстена сочетает свойства гепатопротектора, холеретика и холекинетика, оказывает спазмолитическое и противовоспалительное действие на гепатобилиарную систему.

## **Фармакокинетика**

Не исследовалась.

## **Показания**

Капли оральные:

- лечение острых и хронических заболеваний печени, желчевыводящих путей и пузыря;
- в комплексной терапии хронического панкреатита;
- для защиты и восстановления печени при применении антибиотиков, противогрибковых, болеутоляющих, противовоспалительных и других гепатотоксических препаратов и алкоголя.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность (аллергия) к любому из компонентов препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Клинически значимое взаимодействие препарата Галстена® с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными средствами и методами лечения.

## **Особенности применения**

Галстена® – відновлює, захищає, очищує печінку, нормалізує роботу жовчного міхура попереджає утворення каменів

- Покращує метаболічні процеси в печінці і сприяє регенерації пошкоджень
- Попереджає і усуває розвиток запальних процесів у печінці, жовчному міхурі та жовчовивідних шляхах
- Покращує детоксикаційну функцію печінки
- Нормалізує процес желчеобразования і жовчовиділення

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными и механическими средствами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

В настоящее время отсутствуют доказательства существования особого риска применения лекарственного средства в период беременности или кормления грудью. Препарат следует применять с осторожностью в период беременности и кормления грудью и только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

*Фертильность.* Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

## **Способ применения и дозы**

Галстена®, капли оральные:

- взрослые и дети старше 12 лет — по 10 капель в чистом виде или развести в 1 столовой ложке воды;
- дети, возраст 5-12 лет — по 5-7 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды;

- дети, возраст 2–4 года — по 2–4 капли препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды.

Принимать препарат 3 раза в сутки.

В начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого уменьшения выраженности симптомов, рекомендован прием препарата каждые  $\frac{1}{2}$ –1 ч до 8 раз в сутки до улучшения состояния, но не более 3 сут, после чего принимать 3 раза в сутки.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется принимать препарат Галстена® , капли оральные, в промежутках между приемами пищи (за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи), подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.

При увеличении выраженности симптомов, или в случае, если улучшения не наступает после 7 дней лечения, необходимо проконсультироваться с врачом. Курс лечения в зависимости от характера и тяжести заболевания определяет врач.

Обычно продолжительность курса лечения: гепатит, гепатоз, цирроз печени — не менее 3 мес. Хронический холецистит, желчнокаменная болезнь, постхолецистэктомический синдром — 2–3 мес. При необходимости курс можно повторить через 1 мес. При дискинезии желчевыводящих путей продолжительность курса лечения — 2–3 нед. Для защиты клеток печени после антибиотикотерапии и других вредных воздействий — 2–4 нед.

## **Дети**

Применять препарат Галстена®, таблетки, в возрасте от 6 лет.

В возрасте от 6 до 12 лет применяется по рекомендации врача.

Для лечения детей в возрасте от 2 до 6 лет можно применять препарат Галстена® в форме капель.

Применение препарата Галстена®, капли оральные, у детей до 2 лет не рекомендуется из-за недостатка данных.

## **Передозировка**

Случаев передозировки не зарегистрировано.

## **Побочные реакции**

В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью к любому из компонентов препарата возможны аллергические реакции. При появлении каких-либо побочных эффектов необходимо прекратить применение лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

### **Условия хранения**

Капли оральные. В плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С.

### **Упаковка**

По 20 мл во флаконах-капельницах из темного стекла, в картонной упаковке.

### **Производитель**

Рихард Биттнер АГ, Австрия

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).