

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит фламина в пересчете на содержание суммы флавоноидов 70% 50 мг;

вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, крахмал картофельный; крахмал кукурузный магния карбонат; кальция стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки желтого или желтого с буроватым оттенком цвета, с вкраплениями, со слабым специфическим запахом, плоскоцилиндрической формы, с фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Код АТХ А05А Х.

Фармакодинамика

Флавоногликозид полифенольный лекарственное средство из соцветий бессмертника песчаного (бессмертник). Содержит флавоноидные гликозиды (салипурпозид, изосалипурпозид, кемпферол, апигенин), горечи, дубильные вещества, стерины, эфирные масла и другие биологически активные вещества (органические кислоты, каротиноиды, полисахариды).

Увеличивает желчеотделение, изменяет соотношение «холестерин/желчные кислоты», увеличивает содержание холатов в желчи, предупреждает образование желчных камней. Оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру сфинктеров желчного пузыря и желчевыводящих путей. Стимулируя выделение желудочного сока, способствует лучшему перевариванию пищи. Проявляет гипохолестеринемическое и гепатопротекторное действие. Препарат уменьшает воспалительный процесс в паренхиме печени и желчевыводящих путях, облегчает кровообращение в печени. Важнейшей в фармакодинамике препарата является его свойство стабилизировать клетки и субклеточные мембраны печени, основанный на его антиоксидантной эффекте.

Фармакокинетика

Не исследовалась.

Показания

Хронический холецистит, хронический гепатит, дискинезия желчевыводящих путей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; обтурационная желтуха, желчнокаменная болезнь с наличием камней более 10 мм в диаметре, обострение язвенной болезни, острые воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат можно применять в комплексе с другими лекарственными средствами, которые назначаются при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.

Повышает активность метронидазола и аминохинола при лечении лямблиоза.

При необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Особенности применения

С осторожностью назначать пациентам с повышенной кислотопродуцирующей функцией желудка.

Лекарственное средство содержит лактозу. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Особенности применения лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не исследованы. Применение лекарственного средства

возможно, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Применять взрослым и детям старше 5 лет внутрь, за 30 минут до еды, запивая небольшим количеством воды.

Взрослым и детям старше 14 лет применять по 50 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки; при необходимости дозу можно увеличить до 100 мг (2 таблетки) 2-3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 10 до 14 лет применять по 50 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки.

Детям в возрасте от 5 до 10 лет применять по 50 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки.

Продолжительность курса лечения составляет 10-40 дней (в зависимости от характера, степени тяжести и течения заболевания). При необходимости курс лечения можно повторить по назначению врача.

Дети

Препарат применять для лечения детей в возрасте от 5 лет.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны.

Побочные реакции

Обычно препарат хорошо переносится. Редко возможны аллергические реакции (в т. ч. сыпь, крапивница, зуд, гиперемия) повышение артериального давления (у больных артериальной гипертензией). При длительном применении возможны явления холестаза.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).