

## **Состав**

*действующее вещество:* липы цветки (Tiliae flores)

1 пачка содержит липы цветков (Tiliae flores) 50 г;

1 фильтр-пакет содержит липы цветков (Tiliae flores) 1,5 г.

## **Лекарственная форма**

Цветка.

Основные физико-химические свойства: кусочки цветков, цветоножек и прицветников различной формы; желтовато-белого, зеленовато или желтовато-серого, светло-желтого, желтовато-зеленого цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические средства. Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества препарата оказывают противовоспалительное, антисептическое, потогонное, желчегонное, мягкое седативное действие, усиливают секрецию желудочного сока.

## **Показания**

Внутренне - при простудных заболеваниях, бронхитах, наружно - при ангинах, стоматитах, ларингитах, гингивитах (в составе комплексной терапии).

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Поллиноз

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

По назначению врача в случае польза для матери потенциальный риск для плода / ребенка.

### **Способ применения и дозы**

2 столовые ложки цветков поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедура процедуры, остаток отжать в процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2-3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет - по  $\frac{1}{2}$ -1 стакану, детям 12-14 лет - по  $\frac{1}{3}$  стакана, 7-12 лет - по  $\frac{1}{4}$  стакана, 3-7 лет - по 2 столовые ложки. Внешне применять для полоскания ротовой полости и горла 3-4 раза в сутки. Перед применением настоек взболтать.

3 фильтра-пакеты в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 2-3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет - по 1 стакану, детям 12-14 лет - по  $\frac{1}{2}$  стакана, 7-12 лет - по  $\frac{1}{3}$  стакана, 3-7 лет - по  $\frac{1}{4}$  стакана. Внешне применять для полоскания ротовой полости и горла 3-4 раза в сутки.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

### **Дети**

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

### **Передозировка**

Сообщения отсутствуют.

### **Побочные реакции**

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

### **Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности, на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

50 г в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО «Лектравы», Украина.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.