

Состав

действующее вещество: густой водный экстракт листьев артишока полевого (Cynara scolymus)

100 мл раствора содержат густого водного экстракта листьев артишока полевого (Cynara scolymus) 10-20 1 20 г;

вспомогательные вещества: этанол 96%, спиртовая настойка цедры апельсина, глицерин, метилпарагидроксибензоат (E 218), пропилпарагидроксибензоат (E 216), вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор оральный.

Основные физико-химические свойства: темно-коричневый непрозрачный раствор с легким желтоватым осадком.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.
Средства, применяемые при билиарной патологии.

Код АТХ А05А Х.

Фармакодинамика

Фармакологические свойства обусловлены действием комплекса биологически активных веществ, входящих в состав листьев артишока полевого. Оказывает желчегонное, гепатопротекторное и мочегонное действие, также снижает содержание мочевины в крови. Инулин и другие составляющие, которые содержит артишок, улучшают обменные процессы в организме.

Фармакокинетика

Действие препарата Хофитол является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты нельзя проследить с помощью маркеров или биоисследований. По той же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания

Улучшение желчегонного и диуретической функции при заболеваниях печени, желчевыводящих путей и почек, таких как цирроз печени, хронический некалькулезный холецистит, дискинезия желчных путей по гипокинетическому типу, хронический нефрит, хроническая почечная недостаточность.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности к метилпарабен или пропилпарагидроксибензоат, к растениям семейства Astraceae (сложноцветных) гепатит, непроходимость желчных путей, холангит, нагноение (эмпиема) желчного пузыря, желчнокаменная болезнь или другие заболевания желчных путей, острые заболевания печени, тяжелая печеночная недостаточность непроходимость мочевыводящих путей, острые заболевания почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Комбинации, которые нужно принять во внимание (учитывая наличие этанола (0,20 г чайную ложку) в препарате):

- средства, которые могут вызвать реакцию антабуса (ощущение потепления, покраснение, тошнота, тахикардия) при применении с этанолом;
- средства, которые подавляют функцию центральной нервной системы.

Особенности применения

Поскольку препарат содержит этанол, следует избегать употребления любых напитков, содержащих алкоголь.

Применять с осторожностью при заболеваниях, которые могут привести к непроходимости желчных путей и при тяжелых заболеваниях печени. В случае возникновения диареи или боли в животе лечение следует прекратить и проконсультироваться с врачом.

Это лекарственное средство содержит 5,1 об. % Этанол (алкоголя), то есть 200 мг/доза, что эквивалентно 5,1 мл пива, 2,1 мл вина в дозе.

Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и кормящим грудью, детям и пациентам с

заболеваниями печени и большим эпилепсией.

1 чайная ложка раствора препарата содержит 0,20 г этанола.

Содержит глицерин, метилпарабен (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Может влиять на способность управлять автотранспортом и другими механизмами, поскольку препарат содержит этанол.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью препарат применяют только по назначению врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Для перорального применения. Перед применением раствор нужно взболтать и развести водой.

Взрослым по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки перед едой.

Детям старше 12 лет - ½-1 чайную ложку раствора развести в 1 столовой ложке воды и принимать 3 раза в день за 20 минут до еды.

Курс лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 2 - 3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно после согласования с врачом.

Дети

Применяют детям старше 12 лет по назначению врача. Детям до 12 лет рекомендуется применять препарат Хофитол в форме таблеток, покрытых оболочкой.

Передозировка

Возможно усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

В случае длительного применения препарата в высоких дозах возможно диарея, а также спазмы в животе, расстройства желудка, тошнота, изжога.

Возможны аллергические реакции, включая крапивницу, сыпь, гиперемия, зуд.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 120 мл во флаконе. По 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Лаборатории Роза-Фитофарма.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

2 авеню, Римского договора 78400 ШАТУ, Франция.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).