

Состав

действующее вещество: густой водный экстракт листьев артишока полевого (Cynara scolymus)

100 мл раствора содержат густого водного экстракта листьев артишока полевого (Cynara scolymus) 10-20 г;

вспомогательные вещества: этанол 96%, спиртовая настойка цедры апельсина, глицерин, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор оральный.

Основные физико-химические свойства: темно-коричневый непрозрачный раствор с легким желтоватым осадком.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.
Средства, применяемые при билиарной патологии.

Код АТХ А05А Х.

Фармакодинамика

Фармакологические свойства обусловлены действием комплекса биологически активных веществ, входящих в состав листьев артишока полевого. Оказывает желчегонное, гепатопротекторное и мочегонное действие, также снижает содержание мочевины в крови. Инулин и другие составляющие, которые содержит артишок, улучшают обменные процессы в организме.

Фармакокинетика

Действие препарата Хофитол является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты нельзя проследить с помощью маркеров или биоисследований. По той же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания

Улучшение желчегонного и диуретической функции при заболеваниях печени, желчевыводящих путей и почек, таких как цирроз печени, хронический некалькулезный холецистит, дискинезия желчных путей по гипокинетическому типу, хронический нефрит, хроническая почечная недостаточность.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности к метилпарабен или пропилпарагидроксибензоат, к растениям семейства *Astraceae* (сложноцветных) гепатит, непроходимость желчных путей, холангит, нагноение (эмпиема) желчного пузыря, желчнокаменная болезнь или другие заболевания желчных путей, острые заболевания печени, тяжелая печеночная недостаточность непроходимость мочевыводящих путей, острые заболевания почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Комбинации, которые нужно принять во внимание (учитывая наличие этанола (0,20 г чайную ложку) в препарате):

- средства, которые могут вызвать реакцию антабуса (ощущение потепления, покраснение, тошнота, тахикардия) при применении с этанолом;
- средства, которые подавляют функцию центральной нервной системы.

Особенности применения

Поскольку препарат содержит этанол, следует избегать употребления любых напитков, содержащих алкоголь.

Применять с осторожностью при заболеваниях, которые могут привести к непроходимости желчных путей и при тяжелых заболеваниях печени. В случае возникновения диареи или боли в животе лечение следует прекратить и проконсультироваться с врачом.

Это лекарственное средство содержит 5,1 об. % Этанол (алкоголя), то есть 200 мг/доза, что эквивалентно 5,1 мл пива, 2,1 мл вина в дозе.

Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и кормящим грудью, детям и пациентам с

заболеваниями печени и большим эпилепсией.

1 чайная ложка раствора препарата содержит 0,20 г этанола.

Содержит глицерин, метилпарабен (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Может влиять на способность управлять автотранспортом и другими механизмами, поскольку препарат содержит этанол.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью препарат применяют только по назначению врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Для перорального применения. Перед применением раствор нужно взболтать и развести водой.

Взрослым по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки перед едой.

Детям старше 12 лет - ½-1 чайную ложку раствора развести в 1 столовой ложке воды и принимать 3 раза в день за 20 минут до еды.

Курс лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 2 - 3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно после согласования с врачом.

Дети

Применяют детям старше 12 лет по назначению врача. Детям до 12 лет рекомендуется применять препарат Хофитол в форме таблеток, покрытых оболочкой.

Передозировка

Возможно усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

В случае длительного применения препарата в высоких дозах возможно диарея, а также спазмы в животе, расстройства желудка, тошнота, изжога.

Возможны аллергические реакции, включая крапивницу, сыпь, гиперемия, зуд.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 120 мл во флаконе. По 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Лаборатории Роза-Фитофарма.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

2 авеню, Римского договора 78400 ШАТУ, Франция.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).