

Состав

действующее вещество: сухой водный экстракт листьев артишока полевого (*Cynara scolymus*)

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит сухого водного экстракта листьев артишока полевого (*Cynara scolymus*) 200 мг;

вспомогательные вещества: магния трисиликат, крахмал кукурузный кукурузный, тальк, магния стеарат оболочка: шеллак, канифоль, тальк, желатин, сахароза, кальция карбонат, воск карнаубский, полисорбат 80, краситель дисперсный (сахароза, железа оксид желтый (E172), железа оксид черный (E172), железа оксид коричневый (E 172), метилпарагидроксибензоат (E 218), этилпарагидроксибензоат (E 214)).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой.

Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой коричневого цвета. На поверхности таблеток допускаются вкрапления менее интенсивного цвета, чем основной.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.
Средства, применяемые при билиарной патологии.

Код АТХ А05А Х.

Фармакодинамика

Фармакологические свойства обусловлены действием комплекса биологически активных веществ, входящих в состав листьев артишока полевого. Оказывает желчегонное, гепатопротекторное и мочегонное действие, также снижает содержание мочевины в крови. Инулин и другие составляющие, которые содержит артишок, улучшают обменные процессы в организме.

Фармакокинетика

Действие препарата Хофитол является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным;

все вместе компоненты нельзя проследить с помощью маркеров или биоисследований. По той же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания

Для улучшения желчегонного и диуретической функции при заболеваниях печени, желчевыводящих путей и почек, таких как: хронический гепатит, цирроз печени, хронический некалькулезный холецистит, дискинезия желчных путей по гипокинетическому типу, хронический нефрит, хроническая почечная недостаточность.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности к метилпарабену или этилпарагидроксибензоату, к растениям семейства Astraceae (сложноцветных) непроходимость желчных путей, холангит, нагноение (эмпиема) желчного пузыря, желчнокаменная болезнь или другие заболевания желчных путей, острые заболевания печени, тяжелая печеночная недостаточность непроходимость мочевыводящих путей, острые заболевания почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

Применять с осторожностью при заболеваниях, которые могут привести к непроходимости желчных путей и при тяжелых заболеваниях печени. В случае возникновения диареи или боли в животе лечение следует прекратить и проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит сахарозу. Поэтому пациенты с непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или недостаточностью цукразы-изомальтазы не должны применять препарат.

Препарат содержит парагидроксибензоат, что может вызвать аллергические реакции (возможно отсроченные).

Содержит метилпарагидроксибензоат (Е 218), этилпарагидроксибензоат (Е 214) в составе красителя. Одна таблетка содержит 0,08 г сахарозы.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью препарат применяют только по назначению врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым и детям старше 6 лет. Принимают перед едой.

Взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 таблетки 3 раза в сутки.

Детям в возрасте 6 - 12 лет - по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Курс лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 2 - 3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно после согласования с врачом.

Дети

Применяют детям старше 6 лет по назначению врача.

Передозировка

Возможно усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

В случае длительного применения препарата в высоких дозах возможно диарея, а также спазмы в животе, расстройства желудка, тошнота, изжога.

Возможны аллергические реакции, включая крапивницу, сыпь, гиперемия, зуд.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 таблеток, покрытых оболочкой, в блистере, по 6 блистеров в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Лаборатории Роза-Фитофарм.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

2 авеню, Римского договора 78400 одежду, Франция.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).