

Состав

действующее вещество: душицы трава;

1 пачка содержит душицы траву 50 г.

Лекарственная форма

Трава.

*Основные физико-химические свойства:*измельченное сырье: кусочки листьев, стеблей, соцветий и отдельные цветки зеленого или пурпурного, серовато-зеленого, зеленовато-пурпурного или темно-пурпурного цвета с коричневатопурпурными, коричневаторозовыми, пурпурными, темно-пурпурными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.

Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A.

Фармакодинамика

Препараты душицы повышают секрецию пищеварительных, бронхиальных и потовых желез, действуют успокаивающе на центральную нервную систему, усиливают перистальтику и тонус кишечника, сокращение гладкой мускулатуры матки, стимулируют секрецию желчи, повышают диурез, регулируют менструальный цикл, обладают обезболивающим свойствами.

Показания

Воспалительные заболевания дыхательных путей (ларингиты, бронхиты, трахеиты) холециститы и дискинезии желчевыводящих путей; снижение аппетита, ухудшение пищеварения, особенно при секреторной недостаточности желудочно-кишечного тракта энтероколиты, сопровождающиеся запорами и метеоризмом; повышенная нервная возбудимость.

Противопоказания

Повышенная секреция желудочно-кишечного тракта, чувствительность к биологически активным веществам, которые содержатся в лекарственном средстве.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не назначать в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

2 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждать при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Взрослым принимать настой в теплом виде по $\frac{1}{3}$ стакана 3 раза в день за 15-20 мин до еды.

Дети в возрасте 1-3 лет - по 1 чайной ложке, 3-5 лет - по 1 десертной ложке, 5-7 лет - по 1 столовой ложке, 7-12 лет - по 2 столовые ложки, 12-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана в возрасте от 14 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана 3 раза в день за 15-20 мин до еды.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2-8 °С) не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Не рекомендуется применять детям до 1 года. Дозу препарата для детей от 1 года определяет врач.

Передозировка

Сообщений о передозировке препарата не поступало.

Побочные реакции

При индивидуальной гиперчувствительности к препарату возможны аллергические реакции (гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.