

## **Состав**

*действующее вещество:* 5 мл сиропа содержат алтея корня экстракта сухого (*Althaeae radix*) (экстрагент – вода) в пересчете на 20,0 % содержание полисахаридов – 7,5 мг;

*вспомогательные вещества:* метилпарагидроксибензоат (Е 218) (консервант), сахар-рафинад, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Сироп.

*Основные физико-химические свойства:* сиропобразная жидкость, от желто-бурого до красно-бурого цвета со специфическим запахом. В процессе хранения допускается наличие осадка.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A05.

## **Фармакодинамика**

Сироп на основе экстракта корня алтея является комплексным растительным препаратом, содержащим полисахариды как основное действующее вещество, а также пектины, аминокислоты, крахмал. Препарат обладает бронхосекреторным, отхаркивающим, обволакивающим действием. Рефлекторно стимулирует секрецию бронхиальных и слюнных желез. Активирует образование мокроты, нормализуя ее реологические свойства (вязкость, эластичность, адгезивность), усиливает перистальтическое движение бронхиол и моторную функцию мерцательного эпителия бронхов, вызывая цитопротекторный и противовоспалительный эффекты, содействует регенерации ткани.

## **Фармакокинетика**

Не исследовалась.

## **Показания**

Кашель при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей: бронхиты, ларингиты, трахеиты, бронхиальная астма, коклюш.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не рекомендуется применять одновременно с противокашлевыми средствами (например, кодеином).

## **Особенности применения**

*Не следует нарушать правила применения лекарственного средства.*

В процессе хранения допускается выпадение осадка. Перед применением взболтать.

Если во время лечения развивается одышка, повышение температуры тела или появляется гнойная мокрота, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Абсорбция препаратов, применяемых одновременно, может снижаться. Другие препараты необходимо применять за 1 час до или через 1 час после применения экстракта корня алтея.

С осторожностью применять при сахарном диабете.

Наличие в составе метилпарагидроксибензоат (Е 218) может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Применение препарата не влияет на способность управлять автотранспортом и работать с другими механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Информация об опыте применения препарата в период беременности или кормления грудью отсутствует.

## **Способ применения и дозы**

Перед применением взбалтывать. Препарат принимать до еды: взрослым и детям с 14 лет - по 15 мл сиропа 4-6 раз в сутки.

Детям с 6 до 14 лет препарат применять по 10 мл сиропа 4–6 раз в сутки; с 2 до 6 лет – по 5 мл сиропа 4–6 раз в сутки.

Продолжительность курса терапии определяется врачом индивидуально, в зависимости от эффективности лечения и, как правило, составляет 7–14 дней.

## **Дети**

Препарат можно применять детям с 2 лет.

## **Передозировка**

Случаи передозировки неизвестны.

## **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции, усиление слюноотделения, раздражение слизистой оболочки желудка.

В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить лечение и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

3 года.

*Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.*

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

После вскрытия хранить не более 14 суток при температуре 4–8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 200 мл во флаконе, по 1 флакону вместе с мерной ложкой в пачке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ПАО «Галичфарм».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).