

Состав

действующее вещество: настойка травы полыни (*Absinthii herba*) (1:5)
(экстрагент - этанол 70%);

1 флакон содержит настойки травы полыни (*Absinthii herba*) (1:5) (экстрагент - этанол 70%) - 25 мл.

Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость буровато-зеленого цвета, с характерным запахом, с горьким вкусом. Смесь препарата с водой (2:1) дает мутный розчин. Допускается образования осадка при хранении.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, повышающие аппетит. Код АТХ А15.

Фармакодинамика

Полыни настойка содержит горечи. Механизм действия препарата обусловлен раздражением чувствительных нервных окончаний - вкусовых рецепторов слизистых оболочек полости рта, языка, рефлекторным путем вызывает усиление секреции желудочного сока, повышение аппетита, улучшения процесса пищеварения.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Гипоацидные и анацидные гастриты, анорексия - в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная желудочная секреция, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, желчнокаменная болезнь, эпилепсия. Наличие в анамнезе

кровотечений из органов малого таза; анемия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не выявлено.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Поскольку в состав препарата входит этанол, он может влиять на способность управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными механизмами, поэтому на период лечения следует воздержаться от работы с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не следует применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Полыни настойку взрослым и детям старше 12 лет по 15 - 20 капель 3 раза в день за 15 - 30 минут до еды. Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально и зависит от тяжести заболевания, характера сопутствующей терапии, достигнутого эффекта.

Дети

Не следует применять детям до 12 лет. Детям старше 12 лет препарат применяют по назначению врача.

Передозировка

Применение в повышенных дозах, особенно длительное, может привести к отравлению - развития судорог, галлюцинаций, потери сознания.

При длительном применении возможны атонические запоры.

Лечение. Симптоматическое.

Побочные реакции

Длительное применение полыни настойки может вызвать так называемую полынную эпилепсию. Тошнота, рвота, возможны реакции повышенной чувствительности (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд). При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. При хранении допускается образование осадка.

Упаковка

По 25 мл в флаконах, по 1 флакону в пачке или флакон без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).