

## **Состав**

*действующее вещество:* настойка травы полыни (*Absinthii herba*) (1:5)  
(экстрагент - этанол 70%);

1 флакон содержит настойки травы полыни (*Absinthii herba*) (1:5) (экстрагент - этанол 70%) - 25 мл.

## **Лекарственная форма**

Настойка.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная жидкость буровато-зеленого цвета, с характерным запахом, с горьким вкусом. Смесь препарата с водой (2:1) дает мутный розчин. Допускается образования осадка при хранении.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, повышающие аппетит. Код АТХ А15.

## **Фармакодинамика**

Полыни настойка содержит горечи. Механизм действия препарата обусловлен раздражением чувствительных нервных окончаний - вкусовых рецепторов слизистых оболочек полости рта, языка, рефлекторным путем вызывает усиление секреции желудочного сока, повышение аппетита, улучшения процесса пищеварения.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

Гипоацидные и анацидные гастриты, анорексия - в составе комплексной терапии.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная желудочная секреция, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, желчнокаменная болезнь, эпилепсия. Наличие в анамнезе

кровотечений из органов малого таза; анемия.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не выявлено.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Поскольку в состав препарата входит этанол, он может влиять на способность управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными механизмами, поэтому на период лечения следует воздержаться от работы с потенциально опасными механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Не следует применять в период беременности и кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Полыни настойку взрослым и детям старше 12 лет по 15 - 20 капель 3 раза в день за 15 - 30 минут до еды. Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально и зависит от тяжести заболевания, характера сопутствующей терапии, достигнутого эффекта.

### **Дети**

Не следует применять детям до 12 лет. Детям старше 12 лет препарат применяют по назначению врача.

### **Передозировка**

Применение в повышенных дозах, особенно длительное, может привести к отравлению - развития судорог, галлюцинаций, потери сознания.

При длительном применении возможны атонические запоры.

*Лечение.* Симптоматическое.

### **Побочные реакции**

Длительное применение полыни настойки может вызвать так называемую полынную эпилепсию. Тошнота, рвота, возможны реакции повышенной чувствительности (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд). При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

### **Срок годности**

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. При хранении допускается образование осадка.

### **Упаковка**

По 25 мл в флаконах, по 1 флакону в пачке или флакон без пачки.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).