Состав

действующее вещество: 1 флакон содержит настойки травы и листьев полыни горькой (1: 5) (Absinthii herba et folia) (экстрагент - этанол 70%) - 25 мл.

Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: жидкость буровато-зеленого цвета с характерным запахом. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средство растительного происхождения, повышает аппетит. Горечь (amara). Код АТХ А 15.

Фармакодинамика

Раздражает чувствительные нервные окончания вкусовых рецепторов слизистых оболочек полости рта, языка, рефлекторным путем вызывает усиление секреции желудочного сока, повышение аппетита, улучшения процесса пищеварения.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Гипоацидный и анацидный гастрит, анорексия - в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная желудочная секреция, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная болезнь, рефлюкс-эзофагит, эпилепсия. Беременность. Возраст до 12 лет. Наличие в анамнезе кровотечений из органов малого таза, анемия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не выявлено.

Особенности применения

Лекарственное средство является обычным лекарственным средством растительного происхождения для применения в соответствии с показаниями, подтвержденных длительным применением.

Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения данного лекарственного средства, наблюдаются любые побочные реакции.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Поскольку в состав лекарственного средства входит этанол, он может влиять на способность управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными механизмами, поэтому на период лечения лекарственным средством следует воздержаться от работы с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применять женщинам в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь по 15-20 капель 3 раза в день за 15-30 мин до приема пищи. Продолжительность приема определяется индивидуально и зависит от тяжести заболевания, характера сопутствующей терапии, достигнутого эффекта.

Дети

Не следует применять детям до 12 лет. Детям старше 12 лет препарат применяют по назначению врача.

Передозировка

Прием в повышенных дозах, особенно длительное, может привести к отравлению - развития судорог, галлюцинаций, потери сознания.

При длительном применении возможны атонические запоры.

Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Длительное применение настойки полыни может вызвать так называемую полынную эпилепсией, прием в повышенных дозах, особенно длительное, может привести к отравлению - развития судорог, галлюцинаций и др.

Тошнота, рвота, реакции повышенной чувствительности (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд).

Абсинтин, содержащийся в полыни, при длительном употреблении может вызвать атонии кишечника. *При появлении побочных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.*

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл во флаконах-капельницах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4