

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 таблетка содержит травы термопсиса ланцетного (*Herba Thermopsis lanceolata*) в мелком порошке 0,0067 г, натрия гидрокарбоната 0,25 г;

*вспомогательные вещества:* тальк, кальция стеарат, крахмал картофельный.

## **Лекарственная форма**

Таблетки.

*Основные физико-химические свойства:* таблетки зеленовато-серого или желто-бурого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской и чертой. Допускается наличие вкраплений.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05X.

## **Фармакодинамика**

Трава термопсиса обладает отхаркивающим действием, оказывает умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию бронхиальных желез.

Алкалоиды (цитизином, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин, термопсидин), содержащиеся в траве термопсиса, оказывают возбуждающее действие на дыхательный центр, а в высоких дозах - и на рвотный центр.

Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует снижению вязкости мокроты.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

В комплексной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с мокротой, которая тяжело отделяется (трахеит, бронхит).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, кровохарканье.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов травы термопсиса в желудочно-кишечном тракте. Препарат не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и с другими препаратами, угнетающими кашель.

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется употреблять большое количество теплой жидкости.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Исследования по изучению влияния на способность управлять автотранспортом или другими механизмами не проводились.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано.

## **Способ применения и дозы**

Взрослым препарат следует принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 3-5 дней, детям старше 12 лет - по ½-1 таблетке 3 раза в сутки в течение 3-5 суток.

## **Дети**

Применение препарата у детей до 12 лет противопоказано.

## **Передозировка**

Тошнота, рвота, слабость, диарея, головокружение, холодный пот, бледность, синюшность слизистых оболочек, при тяжелом отравлении возможны нарушения сознания, возбуждение, галлюцинации, судороги. Лечение - промывание желудка, солевые слабительные, активированный уголь, симптоматическая терапия.

## **Побочные реакции**

При индивидуальной повышенной чувствительности к препарату возможно развитие аллергических реакций, в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи. При приеме больших доз - рвота.

## **Срок годности**

4 года.

## **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° С.  
Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

Таблетки № 10 в блистерах (без пачки) или № 20 (10 × 2) в упаковке (в пачке).

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ООО «Тернофарм».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 46010, г.. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).