

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит травы термопсиса ланцетного (*Herba Thermopsis lanceolata*) в мелком порошке 0,0067 г, натрия гидрокарбоната 0,25 г;

вспомогательные вещества: тальк, кальция стеарат, крахмал картофельный.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки зеленовато-серого или желто-бурого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской и чертой. Допускается наличие вкраплений.

Фармакотерапевтическая группа

Комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05X.

Фармакодинамика

Трава термопсиса обладает отхаркивающим действием, оказывает умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию бронхиальных желез.

Алкалоиды (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин, термопсидин), содержащиеся в траве термопсиса, оказывают возбуждающее действие на дыхательный центр, а в высоких дозах - и на рвотный центр.

Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует снижению вязкости мокроты.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

В комплексной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с мокротой, которая тяжело отделяется (трахеит, бронхит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, кровохарканье.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов травы термопсиса в желудочно-кишечном тракте. Препарат не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и с другими препаратами, угнетающими кашель.

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется употреблять большое количество теплой жидкости.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Исследования по изучению влияния на способность управлять автотранспортом или другими механизмами не проводились.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Взрослым препарат следует принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 3-5 дней, детям старше 12 лет - по ½-1 таблетке 3 раза в сутки в течение 3-5 суток.

Дети

Применение препарата у детей до 12 лет противопоказано.

Передозировка

Тошнота, рвота, слабость, диарея, головокружение, холодный пот, бледность, синюшность слизистых оболочек, при тяжелом отравлении возможны нарушения сознания, возбуждение, галлюцинации, судороги. Лечение - промывание желудка, солевые слабительные, активированный уголь, симптоматическая терапия.

Побочные реакции

При индивидуальной повышенной чувствительности к препарату возможно развитие аллергических реакций, в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи. При приеме больших доз - рвота.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Таблетки № 10 в блистерах (без пачки) или № 20 (10 × 2) в упаковке (в пачке).

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 46010, г.. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).