Состав

действующие вещества: 1 упаковка (100 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: аира корней (Calami radix) 9 г, алтея корней (Althaeae radix) 9 г, липы цветков (Tiliae flos) 9 г, календулы цветков (Calendulae flos) 9 г , солодки корней (Liquiritiae radix) 9 г, шалфея листья (Salviae officinalis folium) 9 г, бузины цветков (Sambuci flos) 8 г, крапивы листья (Urticae folium) 8 г, мяты перечной листья (Menthae piperitae folium) 8 г тимьяна ползучего травы (Serpylli herba) 8 г, омана корней (Inulae helenii radix) 7 г, ромашки цветков (Matricariae flos) 7 г.

Лекарственная форма

Сбор.

Основные физико-химические свойства: смесь кусочков разной формы серовато-зеленого цвета с включениями оранжевого и желтого цвета различных оттенков. Запах сильный, приятный.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A.

Фармакодинамика

Препарат БРОНХОФИТ имеет секретолитическое и секретокинетическое действия. Стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, увеличивая содержание слизистого секрета, вследствие чего изменяется соотношение слизистого и серозного компонентов мокроты. Благодаря увеличению количества бронхиального секрета и уменьшению его вязкости облегчается отхаркивание мокроты. БРОНХОФИТ обладает противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами.

Показания

Острые и хронические воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с образованием вязкой мокроты: острый и хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, пневмония.

Противопоказания

Острая и хроническая почечная недостаточность, острая и хроническая печеночная недостаточность, цирроз печени, холестатические расстройства, гипокалиемия, артериальная гипертензия III степени, круп; повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства или к другим растениям семейства губоцветных (Lamiaceae), а также известная аллергия на сельдерей и пыльца березы (возможна перекрестная реакция).

Особые меры безопасности. Следует с осторожностью применять при повышенной свертываемости крови, а также больным бронхиальной астмой и спазмофилию.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат не следует применять вместе с лекарственными средствами, угнетающими кашель, в связи с возможным скоплением мокроты в дыхательных путях.

При длительном применении одновременно с сердечными гликозидами, адренокортикостероидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), слабительными средствами, тиазидными и петлевыми диуретиками возможно нарушение водно-электролитного баланса.

Особенности применения

Если в течение одной недели приема препарата симптоматика сохраняется или во время лечения отмечается ухудшение симптомов заболевания и/или появляются одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В связи с отсутствием достаточного опыта применения препарата в период беременности его следует применять по назначению врача в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для развития плода. При необходимости применения лекарственного средства следует прекратить кормление грудью.

Способ применения и дозы

2 столовые ложки сбора заварить в 500 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 1 часа, процедить.

Взрослым и детям старше 7 лет принимать в теплом виде по ⅔ стакана (150 мл) за 20-30 минут до еды 3 раза в сутки.

Длительность применения определяет врач. Обычно курс лечения составляет 3-4 недели.

Дети

Препарат противопоказан детям в возрасте до 7 лет.

Передозировка

Возможно возникновение отеков, диспептических симптомов, повышение артериального давления и усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

Лекарственное средство обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая его многокомпонентный состав, в основном при индивидуальной гиперчувствительности к любому из компонентов или при нарушении режима приема, возможны аллергические реакции, в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, контактный дерматит, крапивница желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея и т.д.). В случае появления каких-либо негативных реакций следует обратиться к врачу.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 г в пакете, вложенном в пачку.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лет. «А-5».