

Состав

действующее вещество: зверобоя трава (*Hyperici herba*);

1 фильтр-пакет содержит зверобоя травы (*Hyperici herba*) 1,5 г.

Лекарственная форма

Трава.

Основные физико-химические свойства: кусочки стеблей, листьев, цветков различной формы и незрелых плодов, зеленовато-желтого, зеленого, серовато-зеленого, темно-зеленого, зеленовато-коричневого, ярко-желтого или желтого с черными точками, иногда розово-фиолетового цвета .

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Средства для применения в стоматологии. Код АТС А01А D11.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают вяжущее, противовоспалительное и некоторое противомикробное действие, способствует регенерации тканей умеренно влияют на желчеотделение, возбуждают желудочную секрецию.

Показания

В составе комплексной терапии заболеваний желчевыводящих путей (дискинезии желчевыводящих путей, холециститов), желудочно-кишечного тракта (острых и хронических колитов, диареи, метеоризма, гипоацидного гастрита).

При воспалительных процессах полости рта (гингивитах, стоматитах).

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к биологически активным веществам препарата. Артериальная гипертензия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не рекомендуется применение больным, принимающим антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды, противозачаточные, гипотензивные-блокаторы кальциевых каналов, женские половые гормоны, гипохолестеринемические средства (статины), сердечные гликозиды.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Применение препарата у некоторых пациентов может вызвать повышение артериального давления, поэтому следует соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или работе с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано внутреннее применение препарата.

Способ применения и дозы

1,5 столовой ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 30 мин. Процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл.

Применять в теплом виде 3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 16 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана, детям 12-14 лет - по 1-2 столовых ложки, детям в возрасте 15-16 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана .

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настоять 15 мин. Применять в теплом виде 3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 16 лет - по $\frac{1}{2}$ - 1 стакану, детям 12-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана, дети в возрасте 15-16 лет - по $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ стакана.

Внешне применять для полоскания ротовой полости.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Передозировка

Передозировка и длительное применение вызывает ощущение горечи во рту, неприятные ощущения в области печени.

Побочные реакции

Повышение артериального давления, аллергические реакции (гиперемия, сыпь, отек и зуд кожи), фотосенсибилизация (во время лечения следует избегать УФ-излучения).

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 1,5 г в фильтр-пакете № 20 в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., Г.. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.