

Состав

действующее вещество: 1 пакет содержит плантаглюцида 1 г;

вспомогательные вещества: сахар-рафинад.

Лекарственная форма

Гранулы для орального раствора.

Основные физико-химические свойства: гранулы от светло-коричневого с сероватым оттенком до темно-коричневого с сероватым оттенком или темно-серого цвета, со слабым специфическим запахом, сладкие на вкус.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Препараты для лечения кислотозависимых заболеваний. Код АТХ А02Х.

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения, представляет собой препарат из листьев подорожника большого, содержащий смесь полисахаридов.

Усиливает секрецию желудочного сока, повышает его кислотность. Оказывает противовоспалительное, вяжущее и антисептическое действие.

Фармакокинетика

Не исследовалась.

Показания

Гипоацидный гастрит (лечение и профилактика рецидивов) расстройства пищеварения, обусловленные пониженной кислотностью желудочного сока.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими выделение мокроты.

Антациды и блокаторы H₂-рецепторов снижают эффективность препарата.

Особенности применения

Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат. В связи с наличием сахара-рафинада препарат может быть вредным для зубов.

Поскольку препарат содержит сахар-рафинад, это следует учитывать больным сахарным диабетом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Информация по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствует.

Способ применения и дозы

Применять внутрь за 20-30 минут до еды, разводя перед приемом в $\frac{1}{4}$ стакана теплой воды.

Взрослым и детям старше 12 лет применять по 1 пакету 2-3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет - по $\frac{1}{2}$ пакета 2-3 раза в сутки.

Продолжительность лечения в период обострения гастрита составляет 3-4 недели.

Для профилактики рецидивов препарат применять в тех же дозах 1-2 раза в сутки в течение 1-2 месяцев.

Курс и сроки лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Информация по применению препарата детям до 6 лет ограничено.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Обычно препарат хорошо переносится. Иногда возможны изжога, аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи).

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 2 г в пакетах спаренных, 25 пакетов в коробке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания«
Здоровье».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., Город Харьков, улица Шевченка, дом 22.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).