

Состав

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

действующее вещество: 60 мг экстракта листьев полыни *Artemisiae Argyi*, мягкий (20: 1), содержащий 0,48 - 1,44 мг еупатилину и 0,15-0,45 мг джейсеозидину, экстрагент этанол 95%;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая лактоза моногидрат, поллоксамер; натрия кроскармеллоза; кальция силикат; тальк магния стеарат;

покрытие: Спектрабленд белый СМ-1320, Спектрабленд зеленый СМ-1321, Спектрабленд прозрачный СМ-1212, карнаубский воск;

* Тартразин (E102), индиго (E132), Бриллиантовый голубой FCF (E133).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые оболочкой, зеленого цвета и овальной формы с тиснением «SLT» на одной стороне и «DA» - на другой.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности. Код АТХ А02Х.

Фармакодинамика

Стилен оказывает заживляющее действие на слизистую желудка при гастритах путем усиления регенеративных процессов в пораженных клетках слизистой оболочки. Репаративные свойства лекарственного средства обеспечиваются флавоноидами, которые стимулируют синтез белка и улучшают местное кровоснабжение.

Противовоспалительная активность стилен реализуется через выраженными антиоксидантными свойствами, которые предотвращают ПОЛ и блокируют образование биореактивных форм кислорода, подавляя высвобождение лейкотриена D4, вызванного *Helicobacter pylori in vitro*, и снижают активацию транскрипционного фактора NF-κB, ассоциированного с воспалением.

Стилен защищает слизистую оболочку желудка от повреждающего действия различных ульцерогенов, таких как алкоголь и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Защита слизистой желудка от повреждения, вызванного алкоголем, осуществляется за счет подавления активности ксантиноксидазы и оксидативного стресса. Во избежание повреждения слизистой желудка при применении НПВП обеспечивается за счет повышенного высвобождения эндогенного простагландина E₂ с перитонеальных нейтрофилов и снижение выработки простагландина F_{1α}. Стилен стимулирует секрецию слизи эпителием желудка, при этом не влияя на базальную секрецию желудочного сока и выработку соляной кислоты.

Фармакокинетика

Стилен является растительным лекарственным средством и фармакокинетические испытания не проводят.

Показания

Лечение поражений слизистой оболочки желудка (эрозии, геморрагии, гиперемия, отек) при острых и хронических гастритах; гастритах, вызванных инфекцией *Helicobacter pylori* (в случае одновременного назначения лекарственных средств, используемых для эрадикации *Helicobacter pylori*).

Профилактика гастритов, вызванных приемом нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особенности применения

Если не наблюдается улучшения симптомов через 2 недели применения, следует пересмотреть терапию.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Исследований влияния на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами не проводилось.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность

Противопоказано (повышает тонус матки).

Кормление грудью

Неизвестно, попадает лекарственное средство в грудное молоко. Поэтому его не следует применять кормящим грудью.

Способ применения и дозы

Стилен назначают внутрь за 20-30 минут до еды по 1 таблетке 3 раза в день.

Максимальная разовая доза - 1 таблетка. Максимальная суточная доза - 3 таблетки. Продолжительность курса лечения - 2-4 недели.

Дети

Из-за отсутствия опыта применения детям стилиен не следует назначать пациентам до 18 лет.

Передозировка

Исследование случаев передозировки при применении таблеток не проводилось.

Побочные реакции

Со стороны желудочно-кишечного тракта: иногда наблюдались тошнота, анорексия, диарея, рвота, изжога и боли в верхней части живота.

Со стороны нервной системы: иногда наблюдались головокружение и головная боль.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: иногда наблюдались сыпь и зуд.

Со стороны пищеварительной системы: иногда наблюдалось повышение уровня АЛТ.

Имеются сообщения о отек лица, хотя причинная связь с приемом препарата стилен не установлено.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 таблеток в пластиковом контейнере, по 1 контейнеру в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Донг-А СТ Ко., Лтд., Республика Корея.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

(2Ф Секция Б, 3Ф, 4ф Секция Б) 200-23, Пексокгонден 1-ро, Собук-гу, Чхонан-си, Чхунчхон-Намдо, Южная Корея.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).