

Состав

действующие вещества: Chelidonium majus (Chelidonium) D3, Silybum marianum (Carduus marianus) D3, Berberis vulgaris (Berberis) D3, Podophyllum peltatum (Podophyllum) D6;

100 г препарата содержат: Chelidonium majus (Chelidonium) D3 - 300 мг, Silybum marianum (Carduus marianus) D3 - 300 мг, Berberis vulgaris (Berberis) D3 - 1000 мг, Podophyllum peltatum (Podophyllum) D6 - 0,3 мг;

вспомогательные вещества: этанол 20% (об / об).

Лекарственная форма

Раствор оральный.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от светло-желтого до коричнево-желтого цвета, со слабым запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Действие препарата обусловлено совокупным действием его компонентов. Лекарственное средство способствует устранению хронического и острого воспаления желчного пузыря, поджелудочной железы. Регулирует, нормализует процесс пищеварения. Благодаря действию препарата нормализуются желчная секреция и секреция поджелудочной железы.

Фармакокинетика

Препарат быстро и почти полностью всасывается после приема внутрь, в основном в полости рта и далее в желудочно-кишечном тракте. Не депонируется в тканях организма.

Показания

В комплексной терапии хронического панкреатита и хронического холецистита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, цирроз печени, острый гепатит.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Об одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Особенности применения

Лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг / дозу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Лекарственное средство в рекомендуемых дозах не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом и работе с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Способ применения и дозы

Хронический панкреатит

Взрослым - по 8-10 капель на $\frac{1}{4}$ стакана воды 1 раз в сутки, принимать за полчаса до еды или через 1 час после еды. При обострении хронического панкреатита количество приемов препарата может быть увеличена до 3-5 раз в сутки.

Продолжительность курса лечения - до 2 месяцев.

Хронический холецистит

Взрослым - по 8-10 капель на $\frac{1}{4}$ стакана воды 3 раза в сутки, принимать за полчаса до еды или через 1 час после еды.

Продолжительность курса лечения - до 3 месяцев.

Дети

Эффективность и безопасность при применении препарата детям не установлены, поэтому этой категории пациентов препарат не следует применять.

Передозировка

Маловероятно. Симптомы передозировки не описаны.

Побочные реакции

Аллергические реакции, временное обострение основного заболевания.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

3 года.

После вскрытия флакона использовать в течение месяца.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл во флаконе с пробкой-капельницей, по 1 флакону в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Биолик».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 24321, Винницкая обл., Г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).