

## **Состав**

*действующие вещества: Chelidonium majus (Chelidonium) D3, Silybum marianum (Carduus marianus) D3, Berberis vulgaris (Berberis) D3, Podophyllum peltatum (Podophyllum) D6;*

*100 г препарата содержат: Chelidonium majus (Chelidonium) D3 - 300 мг, Silybum marianum (Carduus marianus) D3 - 300 мг, Berberis vulgaris (Berberis) D3 - 1000 мг, Podophyllum peltatum (Podophyllum) D6 - 0,3 мг;*

*вспомогательные вещества: этанол 20% (об / об).*

## **Лекарственная форма**

Раствор оральный.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная жидкость от светло-желтого до коричнево-желтого цвета, со слабым запахом спирта.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Действие препарата обусловлено совокупным действием его компонентов. Лекарственное средство способствует устранению хронического и острого воспаления желчного пузыря, поджелудочной железы. Регулирует, нормализует процесс пищеварения. Благодаря действию препарата нормализуются желчная секреция и секреция поджелудочной железы.

## **Фармакокинетика**

Препарат быстро и почти полностью всасывается после приема внутрь, в основном в полости рта и далее в желудочно-кишечном тракте. Не депонируется в тканях организма.

## **Показания**

В комплексной терапии хронического панкреатита и хронического холецистита.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, цирроз печени, острый гепатит.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

*Об одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.*

### **Особенности применения**

Лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг / дозу.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Лекарственное средство в рекомендуемых дозах не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом и работе с механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности и кормления грудью перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

### **Способ применения и дозы**

#### Хронический панкреатит

Взрослым - по 8-10 капель на  $\frac{1}{4}$  стакана воды 1 раз в сутки, принимать за полчаса до еды или через 1 час после еды. При обострении хронического панкреатита количество приемов препарата может быть увеличена до 3-5 раз в сутки.

Продолжительность курса лечения - до 2 месяцев.

#### Хронический холецистит

Взрослым - по 8-10 капель на  $\frac{1}{4}$  стакана воды 3 раза в сутки, принимать за полчаса до еды или через 1 час после еды.

Продолжительность курса лечения - до 3 месяцев.

## **Дети**

Эффективность и безопасность при применении препарата детям не установлены, поэтому этой категории пациентов препарат не следует применять.

## **Передозировка**

Маловероятно. Симптомы передозировки не описаны.

## **Побочные реакции**

Аллергические реакции, временное обострение основного заболевания.

*В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!*

## **Срок годности**

3 года.

После вскрытия флакона использовать в течение месяца.

*Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.*

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 25 мл во флаконе с пробкой-капельницей, по 1 флакону в пачке из картона.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ЗАО «Биолик».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 24321, Винницкая обл., Г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).