

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 упаковка (100 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: фасоли створок плодов (*Phaseoli fructus (sine semine)*) 12 г, одуванчика лекарственного корней (*Taraxaci officinalis radix*) 12 г, бессмертника песчаного цветков (*Helichrysi arenarii flos*) 12 г, шиповника плодов (*Rosae pseudo-fructus*) 12 г, кукурузы столбиков с рыльцами (*Zeaе maydis styli cum stigmatis*) 11 г, календулы цветков (*Calendulae flos*) 11 г, галеги лекарственной травы (*Galegae herba*) 10 г, крапивы листья (*Urticae folium*) 10 г, расторопши плодов (*Silybi mariani fructus*) 10 г.

## **Лекарственная форма**

Сбор.

*Основные физико-химические свойства:* смесь кусочков разной формы серовато-зеленого цвета с коричневато-красными, желтыми и белыми включениями. Запах приятный.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.

Код АТХ А05.

## **Фармакодинамика**

Гепатофит способствует восстановлению клеток печени (гепатоцитов), улучшает антитоксическую функцию печени, усиливает желчеотделение, снижает тонус желчного пузыря и желчевыводящих путей, повышает концентрацию желчных кислот и уменьшает концентрацию холестерина. Умеренно способствует снижению уровня сахара в крови.

## **Показания**

В составе комплексной терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей (хронический гепатит, хронический холецистит, холангит, дискинезия желчевыводящих путей по гипотоническому типу) в составе комплексной терапии сахарного диабета.

## **Противопоказания**

Артериальная гипертензия III степени, обтурационная желтуха, желчнокаменная болезнь с наличием камней более 10 мм в диаметре, пониженный уровень сахара в крови, острый вирусный гепатит, тромбофлебит, повышенная свертываемость крови, острые отравления различной этиологии повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства или других растений семейства астровых (*Compositae/Asteraceae*).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не установлено.

### **Особенности применения**

Следует с осторожностью применять больным язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, цирроз печени, острый гепатит, острый холецистит и острый панкреатит хроническим панкреатитом или энтероколит в фазе обострения.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять автотранспортом или другими механизмами, но пациентам с вестибулярными нарушениями следует соблюдать осторожность до выяснения индивидуальной реакции.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Данные по безопасности и эффективности применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют, поэтому его не следует назначать в этот период.

### **Способ применения и дозы**

2 столовые ложки сбора заварить в 500 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 1 часа, процедить.

Взрослым и детям старше 7 лет принимать в теплом виде по  $\frac{2}{3}$  стакана (150 мл) по 20-30 минут до еды 3 раза в сутки.

Длительность применения определяет врач. Обычно курс лечения не превышает 4 недель. При необходимости по назначению врача курс лечения можно повторить.

## **Дети**

Препарат противопоказан детям в возрасте до 7 лет.

## **Передозировка**

Возможно усиление проявлений побочных реакций.

## **Побочные реакции**

Лекарственное средство обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая его многокомпонентный состав, в основном при индивидуальной гиперчувствительности к любому из компонентов или при нарушении режима приема, возможны аллергические реакции, в частности:

*со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, диспепсия, изжога, легкая диарея;

*со стороны дыхательной системы:* одышка;

*со стороны мочевыделительной системы:* усиление диуреза;

*со стороны кожи:* аллергические реакции, в том числе зуд, гиперемия, отек кожи;

*другие:* усиление уже имеющихся вестибулярных нарушений.

В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.

## **Срок годности**

2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 100 г в пакете, вложенном в пачку.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лет. «А-5».