

Состав

действующие вещества: Aconitum D3, Gelsemium D3, Ipecacuanha D3, Phosphorus D5, Bryonia D2, Eupatorium perfoliatum D1;

1 таблетка содержит Aconitum D3 25 мг, Gelsemium D3 25 мг, Ipecacuanha D3 25 мг, Phosphorus D5 25 мг, Bryonia D2 25 мг, Eupatorium perfoliatum D1 25 мг;

вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: белые или почти белые, иногда с отдельными темными точками, двухплоскостных таблетки со скошенной кромкой.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат содержит шесть активных компонентов, наиболее приемлемых для лечения острых простудных заболеваний верхних дыхательных путей и гриппа. Средство быстро останавливает типичные признаки острой инфекции дыхательных путей, такие как лихорадка, головная боль, болезненность мышц, а также ринит, фарингит. Препарат усиливает естественную защиту организма и способствует быстрому выздоровлению и восстановлению сил после перенесенного заболевания, таким образом уменьшает признаки истощения (астенический синдром) или предотвращает их. Применение препарата при первых проявлениях заболевания или сразу после контакта с людьми, которые заболели, способствует предотвращению развития заболевания.

Показания

Профилактика и лечение гриппоподобных инфекций, сопровождающихся лихорадкой и других острых респираторных вирусных инфекций, поддерживающее лечение гриппа.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение симптомов заболевания. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При сохранении высокой температуры тела или при ее повышении до уровня выше 39 °С, при сохранении или невыясненности симптоматики, а также при появлении новых симптомов следует проконсультироваться с врачом, так как может идти речь о болезни, которые требуют медицинской помощи.

Предостережение для больных с глютеновой болезнью. Инфлюцид содержит пшеничный крахмал.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны применять препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Инфлюцид в период беременности и кормления грудью можно применять только после тщательной оценки врачом соотношения польза для матери/риск для плода (ребенка).

Способ применения и дозы

При остром заболевании детям в возрасте от 1 до 12 лет применять по 1 таблетке каждые 2 часа (не более 8 таблеток в сутки) до наступления улучшения. При дальнейшем лечении принимать по одной таблетке 3 раза в сутки.

Детям старше 12 лет и взрослым *при остром заболевании* по 1 таблетке каждый час (не более 12 таблеток в сутки) до наступления улучшения, далее - по 1-2 таблетки 3 раза в сутки.

Продолжительность лечения - 7-10 дней (до полного исчезновения симптомов).

Для профилактики респираторно-вирусной инфекции детям в возрасте от 1 до 12 лет рекомендуется применять по 1 таблетке 3 раза в сутки; детям старше 12 лет и взрослым принимать по 1-2 таблетки 3 раза в сутки.

Длительность применения после контакта с больными респираторную инфекцию или грипп - 1 неделя.

Таблетки принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. Детям до 3 лет рекомендуется для удобства применения растворять таблетку в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке воды).

Дети

Препарат назначают детям в возрасте от 1 года.

Передозировка

В случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.

Побочные реакции

В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, желудочно-кишечные расстройства, включая тошноту, рвоту или диарею.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оттоштрассе 24 76227 Карлсруэ, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).