

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит порошки: корни каперсы колючие (*Capparis spinosa*) - 65 мг семян цикория дикого (*Cichorium intybus*) - 65 мг паслена черного (*Solanum nigrum*) - 32 мг кассии западной (*Cassia occidentalis*) - 16 мг коры терминалии Аржун (*Terminalia arjuna*) - 32 мг тамарикса Каль (*Tamarix gallica*) - 16 мг семена тысячелистника обыкновенного (*Achillea millefolium*) - 16 мг железа оксида (*Mandur bhasma*) - 33 мг обработанные водным экстрактом из: еклипты белой (*Eclipta alba*), филантуса горького (*Phyllanthus amarus*), корни берхавии обширной (*Boerhaavia diffusa*), стеблей тиноспоры сердцелистной (*Tinospora cordifolia*), корнеплодов редьки посевной (*Raphanus sativus*), плодов эмблики лекарственной (*Emblica officinalis*), корневища свинчатки цейлонской (*Plumbago zeylanica*), семена ямбели смородиновой (*Embelia ribes*), плодов мираболанового дерева (*Terminalia chebula*), дымянки лекарственной (*Fumaria officinalis*);

вспомогательные вещества: магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, натрия карбоксиметилцеллюлоза, кремния диоксид коллоидный.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые, двояковыпуклые таблетки зеленовато-серого цвета со светлыми и темными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.

Код АТХ А05.

Фармакодинамика

Комбинированное растительное гепатопротекторное средство. Защищает паренхиму печени от действия токсических агентов. Гепатопротекторное действие препарата обусловлено антиоксидантными и мембраностабилизирующими свойствами компонентов, входящих в его состав. Повышает уровень эндогенных токоферолов в гепатоцитах и уровень цитохрома Р450. Лив.52 стимулирует биосинтез белков и фосфолипидов. Способствует восстановлению гепатоцитов, уменьшает дегенеративные, жировые и фиброзные

изменения, усиливает внутриклеточный обмен.

Лекарственное средство регулирует уровень плазменных белков крови, нормализует соотношение альбумин/глобулин. Обеспечивает нормализацию уровня плазменных трансаминаз, холестерина, триглицеридов, уменьшая проявления дислипидемии. Снижает показатели билирубина и щелочной фосфатазы. Повышает способность печени к депонированию гликогена.

Улучшает коллоидные свойства желчи, предупреждает образование желчных камней. Улучшает сократительную функцию желчного пузыря. Улучшает процессы пищеварения и усвоения пищи. Стимулирует гемопоэз.

При алкогольном поражении печени препарат снижает уровень этанола в крови и моче; повышает активность ацетальдегиддегидрогеназы, что способствует снижению уровня ацетальдегида; предотвращает связывание ацетальдегида с белками клетки, ускоряет его выведение.

Показания

Комплексное лечение и профилактика хронических диффузных заболеваний печени, алкогольного поражения печени, радиоактивных и химиотерапевтических поражений печени. Как средство для повышения устойчивости организма при гепатотоксических поражениях, для ускорения выздоровления в период реконвалесценции после тяжелых заболеваний, перенесенных операций. Холецистоангиохолиты и дискинезии желчевыводящих путей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и к другим растениям семейства астровых (Сложноцветные). Желчнокаменная болезнь. Острые воспалительные заболевания желудка и кишечника. Повышенная свертываемость крови, склонность к тромбообразованию.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении Лив.52 и ибупрофена уровень последнего в организме уменьшается вследствие задержки абсорбции. При одновременном применении с тетрациклином или доксициклином уменьшается биодоступность антибиотиков.

Особенности применения

Имеются сообщения о развитии эпидермальный некролиз у больных хроническим и острым инфекционным гепатитом, принимавших Лив.52.

При остром инфекционном гепатите препарат применяют по назначению врача с осторожностью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Таблетки Лив.52 принимают внутрь.

Взрослым и детям старше 14 лет назначают по 2 таблетки 3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 6 до 14 лет назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Курс лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

При алкогольном поражении печени взрослым назначают по 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 1 месяца, затем по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 6 - 12 месяцев.

Дети

Эффективность и безопасность применения препарата у детей до 6 лет не установлена, поэтому противопоказано его назначать этой возрастной категории пациентов.

Передозировка

Случаев передозировки не наблюдалось. Возможно головокружение или усиление проявлений побочных реакций. Специфический антидот отсутствует. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, кожные реакции, в т. ч. токсический эпидермальный некролиз.

Со стороны пищеварительного тракта: диспепсические явления, тошнота, послабление стула.

При применении лекарственного средства возможные реакции гиперчувствительности.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 таблеток в пластиковой банке, по 1 банке в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Хималая Драг Компани.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Макали, Бангалор - 562162, Индия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).