

Состав

действующие вещества: сосны почки (Pini gemmae)

1 пачка содержит: сосны почек (Pini gemmae) 75 г.

Лекарственная форма

Почки.

Основные физико-химические свойства: ОТДЕЛЬНЫЕ почки или по несколько штук в мутовках, без стебля или с остатком стебля; цвет снаружи розово-Бурый, на изломе зеленый или Бурый; запах ароматный, смолистый; вкус горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, которые применяют при кашле и простудных заболеваниях.
Отхаркивающие средства. Код АТС R05C A.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата стимулирует секреторную Активность слизистых оболочек верхних дыхательных путей, оказывают отхаркивающее действие, действуют бактерицидно на патогенную микрофлору носоглотки и ротовой полости, а также имеют слабые мочегонные и потогонные свойства.

Показания

Заболевания дыхательных путей (хронический бронхит, пневмония);
наружно - при ларингит, трахеит, ангина (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Нефрит, нефрозы, пиелит, гломерулонефрит, гепатит, нефропатия беременных, бронхиальная астма.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано внутреннее применение (может спровоцировать поражение почек).

Способ применения и дозы

Применение дозы. 2 столовые ложки почек поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане в течение 30 мин. Охладить при комнатной температуре 10 мин, процедить, остаток отжатые процеженного отвара. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана; детям 12-14 лет - по 2 столовые ложки, 7-12 лет - по 1 столовой ложке, 3-7 лет - по 1 чайной ложке.

Подогретой отвар применять местно для ингаляций и полосканий. Перед применением препарата взболтать.

Приготовлений отвар хранить при температуре 8-15 ° C НЕ более 2 суток.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям от 3 лет.

Передозировка

Передозировка та длительное применение вызывает воспаление слизистых оболочек пищеварительного тракта, мочевыводящих путей, головная боль.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи); альбуминурия, гематурия. При ингаляционном применении возможен бронхоспазм.

Срок годности

2 года.

Или не применять после истечения срока годности, указанным на упаковке.

Условия хранения

Сохранять в оригинальной упаковке при температуре НЕ выше 25°C в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 75 г в пачках или в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., Г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21