

Состав

действующие вещества: 100 г раствора содержат Chamomilla D6 10 г, Cina D6 10 г, Colocynthis D6 10 г, Lac defloratum D6 10 г, Magnesium chloratum D6 10 г;

вспомогательные вещества: глицерин 85 %, вода очищенная, ксилит.

Лекарственная форма

Раствор оральный.

Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный вязкий раствор.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Активные компоненты препарата уменьшают боли в животе (в том числе кишечные колики) и метеоризм.

Показания

Функциональные кишечные расстройства, сопровождающиеся болями в животе (в том числе кишечными коликами) и метеоризмом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно. Не рекомендуется применение лекарственного средства вместе с едой и напитками. Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

Особенности применения

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит небольшое количество алкоголя, менее 100 мг на дозу.

При отсутствии улучшения после 3 дней лечения или при частом повторении симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат предназначен для применения детям.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат предназначен для применения детям.

Способ применения и дозы

Детям от рождения до 6 лет:

- при острых симптомах – по 3 капли раствора через каждый час, но не более 6 раз в сутки;
- после ослабления симптоматики – по 3 капли раствора 3 раза в сутки.

Курс лечения: 3-6 дней.

Раствор следует принимать за 30 минут до или через 30 минут после еды, давая ребенку подержать его перед проглатыванием некоторое время во рту.

При лечении грудных детей раствор можно развести в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

Дети

Препарат назначать детям от рождения до 6 лет.

Передозировка

Передозировка не отмечалась, но возможно усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции. При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться

к врачу.

Срок годности

5 лет.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 мл раствора во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ/ Deutsche
Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия/ Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe,
Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).