

Склад

1 саше містить: активні інгредієнти: *Saccharomyces boulardii* — 250 мг, $5 \cdot 10^9$ КУО, *Lactobacillus rhamnosus* GG AF – $1,5 \cdot 10^9$, мальтодекстрин.

Допоміжні речовини: кристалічна глюкоза. Без ГМО..

Властивості

Буларди Макс — це симбіотик з протидіарейними, антимікробними, антитоксичними та імуномодулюючими властивостями, завдяки яким проявляє високу активність проти широкого спектра патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів.

Saccharomyces boulardii та *Lactobacillus rhamnosus* GG, які входять до складу Буларди Макс, сприяють запобіганню і усуненню симптомів гострої діареї, інтоксикації, а також нормалізації консистенції калових мас, створюють сприятливі умови для відновлення корисної мікрофлори травного тракту.

Антитоксичні властивості *Saccharomyces boulardii* зумовлені виробленням протеаз, які розщеплюють токсини та діють на рецептори ентероцитів, з якими зв'язуються токсини (особливо цитотоксину А, *Clostridium difficile*).

Saccharomyces boulardii та *Lactobacillus rhamnosus* GG пригнічують розвиток облигатних ентеротоксичних анаеробів, порушуючи їхню патогенну адгезію, сприяють зменшенню вираженості симптомів діареї будь-якої етіології, а також усуненню запального процесу та розвитку проявів дисбіозу.

Рекомендації щодо застосування

Буларді Макс рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування з метою загального зміцнення організму і поліпшення регуляції діяльності мікрофлори шлунково-кишкового тракту.

Спосіб застосування та дози

За рекомендацією лікаря вживати Буларди Макс дітям грудного віку, а також дітям до 3 років по 1 саше 1 раз на добу, розчинивши вміст саше в 50–100 мл кип'яченої води кімнатної температури. Дітям віком від 3 років і дорослим (у тому числі вагітним та жінкам, що годують грудьми) вживати по 1 саше 2 рази на добу.

Не додавати до гарячих або алкогольвмісних напоїв!

Курс вживання - від 5 до 10 днів, якщо лікар не призначив інакше.

Для розчинення вмісту використовувати питну воду гарантованої безпеки та якості. Неприпустиме використання питної води з колодязів та каптажних джерел.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до окремих компонентів.

Особливості застосування

Перед початком вживання дієтичної добавки та при одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів рекомендована консультація лікаря. Для максимальної ефективності інтервал між прийомами дієтичної добавки та антибіотиків має становити не менше 3 год.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці виробника при температурі не вище 25 °C у сухому, захищеному від світла місці.