

## **Склад**

*діючі речовини:* 1 супозиторій 1,1 г містить: Atropa bella-donna D2 – 1,1 мг, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 – 4,4 мг, Matricaria recutita D1 – 1,1 мг, Plantago major D3 – 1,1 мг, Pulsatilla pratensis D2 – 2,2 мг, Solanum dulcamara D4 – 1,1 мг;

*допоміжна речовина:* твердий жир.

## **Лікарська форма**

Супозиторії.

*Основні фізико-хімічні властивості:* супозиторії торпедоподібної форми, з гладкою поверхнею, від білого до жовто-білого кольору (колір слонової кістки), зі слабким характерним (не згірклим) запахом. Під час зберігання допускається утворення білого жирового нальоту на поверхні супозиторія.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакологічні властивості**

Препарат протизапальної, знеболювальної, седативної, дезінтоксикаційної, спазмолітичної дії, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного і мінерального походження, що входять до складу препарату.

## **Показання**

Запальні процеси різної локалізації: ЛОР-органів, статевих органів у жінок; інфекційні захворювання (ГРВІ, гострі захворювання верхніх дихальних шляхів, інфекційно-запальні процеси внутрішніх органів), нервові збудження, стан судомної готовності.

## **Противоказання**

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату, до ромашки лікарської або до інших рослин родини складноцвітих.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії**

Препарат сумісний з іншими лікарськими засобами.

### **Особливості щодо застосування**

При утримуванні симптомів або погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Питання щодо доцільності застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально з урахуванням користі/ризиків.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами**

Випадки впливу невідомі.

### **Спосіб застосування та дози**

Препарат застосовувати ректально.

Рекомендована доза для дорослих та дітей віком від 6 місяців при гострих станах – по 1 супозиторію 3-5 разів на добу; при поліпшенні стану – 2-3 рази на добу.

Для новонароджених дітей (з першого дня життя) до 6 місяців – 1 супозиторій, двічі на добу.

Тривалість лікування та частоту застосування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання. Зазвичай курс лікування становить 3-14 днів.

### **Діти**

Препарат рекомендований для застосування дітям від народження.

### **Передозування**

Не відзначалося.

### **Побічні ефекти**

У дуже поодиноких випадках можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж.

## **Термін придатності**

3 роки.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 12 (6 x 2) супозиторіїв у блістері з полівінілхлоридної/поліетиленової плівки, у картонній коробці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.