

Склад

діючі речовини: 1 супозиторій 1,1 г містить: *Atropa bella-donna* D2 – 1,1 мг, *Calcium carbonicum Hahnemanni* D8 – 4,4 мг, *Matricaria recutita* D1 – 1,1 мг, *Plantago major* D3 – 1,1 мг, *Pulsatilla pratensis* D2 – 2,2 мг, *Solanum dulcamara* D4 – 1,1 мг;

допоміжна речовина: твердий жир.

Лікарська форма

Супозиторії.

Основні фізико-хімічні властивості: супозиторії торпедоподібної форми, з гладкою поверхнею, від білого до жовто-білого кольору (колір слонової кістки), зі слабким характерним (не згірклим) запахом. Під час зберігання допускається утворення білого жирового нальоту на поверхні супозиторія.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості

Препарат протизапальної, знеболювальної, седативної, дезінтоксикаційної, спазмолітичної дії, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного і мінерального походження, що входять до складу препарату.

Показання

Запальні процеси різної локалізації: ЛОР-органів, статевих органів у жінок; інфекційні захворювання (ГРВІ, гострі захворювання верхніх дихальних шляхів, інфекційно-запальні процеси внутрішніх органів), нервові збудження, стан судомної готовності.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату, до ромашки лікарської або до інших рослин родини складноцвітих.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

Препарат сумісний з іншими лікарськими засобами.

Особливості щодо застосування

При утримуванні симптомів або погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Питання щодо доцільності застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально з урахуванням користі/ризиків.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Випадки впливу невідомі.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовувати ректально.

Рекомендована доза для дорослих та дітей віком від 6 місяців при гострих станах – по 1 супозиторію 3-5 разів на добу; при поліпшенні стану – 2-3 рази на добу.

Для новонароджених дітей (з першого дня життя) до 6 місяців – 1 супозиторій, двічі на добу.

Тривалість лікування та частоту застосування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання. Зазвичай курс лікування становить 3-14 днів.

Діти

Препарат рекомендований для застосування дітям від народження.

Передозування

Не відзначалося.

Побічні ефекти

У дуже поодиноких випадках можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж.

Термін придатності

3 роки.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 12 (6 x 2) супозиторіїв у блістері з полівінілхлоридної/поліетиленової плівки, у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.