

## **Описание**

Одна доза содержит: не менее 10<sup>7</sup> живых бифидобактерий.

Вспомогательные вещества: сахароза – от 7 до 10%, желатин пищевой – от 0,7 до 1,0%, молоко обезжиренное – от 15 до 25%.

## **Рекомендации по применению**

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта

- для лечения при длительных кишечных дисфункциях неустановленной этиологии;
- при острых кишечных инфекциях (в комплексном лечении дизентерии, сальмонеллеза, эшерихиоза, вирусных диарей), при длительных кишечных дисфункциях стафилококковой этиологии, а также для лечения реконвалесцентов после острых кишечных инфекций при длительной дисфункции кишечника;
- в комплексном лечении детей (в том числе новорожденных, недоношенных), больных пневмонией, сепсисом и другими гнойно-инфекционными болезнями, для профилактики расстройств функции кишечника и предотвращения развития язвенно-некротического энтероколита;
- показан детям с отягощенным преморбидным состоянием: родились преждевременно или с признаками недоношенности, принимающими антибиотики в раннем неонатальном периоде;
- у детей, матери которых испытывали тяжелые токсикозы, экстрагенитальные болезни, длительный безводный период и другую патологию;
- у детей, матери которых имеют лактостаз, трещины сосков и восстанавливают кормление грудью после выздоровления от мастита;
- у ослабленных детей с анемией, гипотрофией, рахитом, диатезом и другими проявлениями аллергии при заболевании коклюшем, особенно при наличии у них каких-либо нарушений функции кишечника;
- при кишечных дисфункциях как следствие дисбактериоза кишечника, возникшего после длительной антибактериальной, гормональной, лучевой и

других видов терапии, стрессовые ситуации и пребывания в экстремальных условиях, а также с целью профилактики указанной патологии;

- из-за сложной эпидситуации в родильных домах с целью профилактики мастита для местной обработки молочных желез кормящих матерей группы "риска" (у женщин с втянутым плоским соском, снижением его эрекции, наличием трещин).

При заболеваниях женской половой сферы:

- при нарушении чистоты влагалищного секрета до III-IV степени у беременных группы "риска", при бактериальных кольпитах, вызванных стафилококком и кишечной палочкой (в монофлоре и в ассоциациях), а также при сенильных кольпитах гормональной природы.

### **Способ применения**

Во флакон добавляют 1-2 чайные ложки кипяченой воды комнатной температуры и взбалтывают.

Рекомендуемая дозировка: детям с 3-х до 12-ти лет – по одному флакону 2 раза в сутки за 30-40 минут до приема пищи; взрослым и детям старше 12-ти лет – по 2 флакона 2-3 раза в сутки за 30-40 минут до приема пищи.

Рекомендуемый срок употребления – 20 дней.

Последующий срок потребления согласовывается с врачом.

Не является лекарственным средством

### **Противопоказание**

Дети до 3 лет, беременность, период лактации, индивидуальная чувствительность к компонентам.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

### **Условия хранения**

Хранить в упаковке производителя в сухом, чистом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре от 2 до 8°С.

### **Срок годности**

12 месяцев с даты изготовления.