Состав

действующее вещество: 1 саше содержит bacillus subtilis 2x10 ^ (9) КОЕ / г (2%); lactobacillus acidophillus 2x10 ^ (9) КОЕ / г (2%); lactobacillus rhamnosus 2x10 ^ (9) КОЕ / г (2%); bifidobacterium longum 2x10 ^ (9) КОЕ / г (4%); лактулоза (90%).

Свойства

Живые бактерии bacillus subtilis имеют высокую антагонистическую активность по отношению к патогенным и условно-патогенных микроорганизмов (стафилококков, энтеробактерий, дрожжеподобных грибов рода Candida) и способствуют нормализации качественного и количественного состава кишечной микрофлоры (бифидумбактерий, лактобацилл, кишечной палочки), а также характеризуются антивирусной активностью в результате синтеза α -2 интерферона, антагонистическое активность в гноеродных флоры в bacillus subtilis самая высокая среди всех известных пробиотических бактерий. Лактобактерии являются типичными представителями нормальной микрофлоры кишечника человека.

Эти микроорганизмы являются анаэробами, конечным продуктом их обмена является молочная кислота (лактат), откуда они и берут свое название. Лактобактерии участвуют в синтезе ряда важных веществ в просвете кишечника, в том числе витаминов. Они наиболее чувствительны к неблаприятным факторам окружающей среды (антибиотики, патогенные бактерии), поэтому при дисбиотических состояниях чаще всего наблюдается именно дефицит лактобактерий. Штамм lactobacillus rhamnosus играет большую роль в плотности межклеточных контактов энтероцитов и предотвращает проникновений патогенных бактерий из просвета в подслизистую основу кишечника.

Бифидобактерии являются самыми многочисленными представителями нормальной микрофлоры человека. Роль бифидобактерий наиболее важная в детском возрасте. У младенцев, которые кормятся грудным молоком их количество достигает 99% всей микрофлоры. Наиболее типичными представителями для человека; bifidobacterium bifidum и; bifidobacterium longum (infantis). Последняя из них считается очень полезной с точки зрения участия в обменных процессах, проходящих в кишечнике человека, переваривании пищи и формировании неспецифической резистентности организма.

Лактулоза в составе Резистина выступает как пребиотик - питательная среда для лакто- и бифидобактерий, она прицельно ускоряет вегетацию именно

специфических для кишечника человека лакто- и бифидобактерий и усиливает их антагонистические свойства по отношению к конковой и другой патогенной флоры. Также лактулоза нормализует перистальтику и пищеварения в кишечнике.

Рекомендации к употреблению

Состав Резистина подобран таким образом, что каждая из бактерий его составляющих имеет свою уникальную, неповторимую свойство.

Меры предосторожности

Чувствительность к компонентам продукта, женщинам в период беременности и лактации. Превышать рекомендуемую суточную норму. Перед применением проконсультироваться с врачом.
Не является лекарственным средством. Без ГМО.

Способ применения и дозы

Дети от 3 до 12 лет по 1 саше 1 раз в день за 30 минут до еды.

Взрослые и дети старше 12 лет: по 1 саше 3 раза в день за 30 минут до еды.

Содержание саше растворить в 30-50 мл кипяченой охлажденной воды.

Препарат растворять до образования гомогенной суспензии, выдержать экспозицию 15-20 мин.

Полученную суспензию выпить и запить небольшим количеством воды за 30- 40 минут до еды. Разведенный препарат не подлежит хранению.

Срок годности

2 года от даты изготовления.

Условия хранения

В оригинальной упаковке, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре от 2 ° С до 25 ° С.

Упаковка

Лиофилизированный порошок или пористая масса в саше. По 10 саше в упаковке, саше весом 2,0 г.

Производитель

ООО «Элемент здоровья».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 03062, г. Киев, ул. Эстонская, 120.