

Описание

Стенка кишки играет важную роль в возникновении симптомов при синдроме раздраженного кишечника (СРК). Даже малейшее нарушение барьера стенок кишечника может позволить вредным элементам и сторонним патогенам проникнуть в кишечник и вызывать раздражение. В результате кишечник может стать раздраженной и чувствительным и это приведет к типичным симптомам синдрома раздраженного кишечника, таких как:

- вздутие и газы;
- боль в животе;
- диарея и запоры.

Подтверждено, что **Альфлорекс® ВІД** СПК с уникальной культурой *Bifidobacterium longum* (*B. longum*) **35624®** уменьшает симптомы синдрома раздраженного кишечника. Культура **35624®** в **Альфлорекс® ВІД** СПК - это часть семьи бактерий, которые передаются матерью ребенку при рождении, естественно живут в кишечнике человека. Она проходит через пищеварительную систему и достигает кишечника в живом виде.

Альфлорекс® ВІД СПК преодолевает типичные симптомы синдрома раздраженного кишечника, закрепляясь на стенках раздраженного кишечника и создавая успокаивающий и укрепляющий слой, тем самым уменьшая нарушения работы кишечной стенки.

Состав

Альфлорекс® ВІД СПК содержит **35624®**, культуру *B. longum*. Другие компоненты: кукурузный крахмал; магния стеарат гипромеллоза.

Альфлорекс® ВІД СПК содержит 1 x 10⁹ (1 миллиард) бактерий культуры **35624®** в каждой капсуле на момент выпуска. Надлежащая доза сохраняется до истечения срока годности.

Рекомендации по применению

Альфлорекс® ВІД СПК предназначен для уменьшения симптомов синдрома раздраженного кишечника, в частности симптомов вздутия, газов, боли в животе, диареи и запоров.

Способ применения

Всегда принимайте **Альфлорекс®** *biđ* СПК в соответствии с этой инструкции, чтобы обеспечить эффективное использование. Сообщите своему врачу, если вы не уверены, как следовать инструкциям по приему **Альфлорекс®** *biđ* СПК, и придерживайтесь его советам.

Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу.

Альфлорекс® *biđ* СПК можно принимать независимо от приема пищи в любое время суток. Глотайте капсулы целиком, запивая достаточным количеством жидкости (например, стаканом воды или молока, не используйте кислые напитки, такие как сок).

Продукт предназначен для перорального применения.

Фруктовые соки обычно кислые, а кислота может повредить культуру **35624®**. Мы рекомендуем принимать **Альфлорекс®** *biđ* СПК с водой или молоком или менее кислыми напитками, например, соевым, миндальным или рисовым молоком.

Однако **Альфлорекс®** *biđ* СПК можно принимать во время еды с фруктовым соком, так как пища поможет защитить культуру **Альфлорекс®** *biđ* СПК.

Поскольку это бактериальный штамм, действие культуры *B. longum* **35624®** можно инактивировать антибиотикотерапией. Мы рекомендуем продолжать принимать **Альфлорекс®** *biđ* СПК с антибиотиками.

Во время приема антибиотиков дозу **Альфлорекс®** *biđ* СПК следует принимать отдельно от дозы антибиотиков.

Частота применения

Принимать по 1 капсуле **Альфлорекс®** *biđ* СПК 1 раз в сутки в течение 1 месяца. Важно принимать **Альфлорекс®** *biđ* СПК ежедневно и пройти полный курс.

Альфлорекс® *biđ* СПК действует немедленно и начинает обогащать флору кишечника там, где это нужно. В течение первых 2 недель это поможет перезапустить вашу систему. Исходное ослабление симптомов следует наблюдать примерно через 1-2 недели регулярного приема **Альфлорекс®** *biđ* СПК. В редких случаях для восстановления флоры кишечника может потребоваться принимать **Альфлорекс®** *biđ* СПК дольше одного месяца, возможно, до 2-3 месяцев. Если ваши симптомы сохраняются этого времени или если у вас появляются новые симптомы, например потеря веса по невыясненным причинам или появление крови в стуле, обратитесь к врачу.

Альфлорекс® *bi*Д СПК остается в кишечнике до пока вы продолжаете его принимать. Он выполняет свое действие в кишечнике, а затем естественным путем будет вымываться с регулярными дефекациями. Принимая по одной капсуле **Альфлорекс® *bi*Д СПК** ежедневно, вы можете убедиться в том, что флора вашего кишечника остается обогащенной необходимыми бактериями.

Предостережение

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не используйте изделие, если контейнер поврежден

Побочные эффекты

Пока не наблюдалось никаких побочных эффектов при применении **Альфлорекс® *bi*Д СПК**.

Нет известных взаимодействий с пищевыми добавками или препаратами.

Если вы заметите какие-либо побочные эффекты, обратитесь к уполномоченному представителю производителя, указанного в инструкции ниже.

Противопоказания

Не используйте продукт в случае повышенной чувствительности или индивидуальной аллергии на один или несколько компонентов продукта.

Дополнительная информация

Альфлорекс® *bi*Д СПК не содержит:

- глютена;
- лактозы;
- молочных продуктов
- консервантов;
- сои.

Альфлорекс® *bi*Д СПК может применяться вегетарианцами.

Пожалуйста, заметьте, что в течение первых недель использования могут возникать незначительные временные изменения в работе кишечника. Это нормальная типичной ситуацией, поскольку **Альфлорекс® *bi*Д СПК** начинает понемногу наполнять кишечник, поэтому важно продолжать принимать его.

Применение в период беременности и лактации

Нет данных о том, что капсулы **Альфлорекс® ВІД** СПК не следует применять во время беременности и кормления грудью. Беременная женщина должна сообщить своему врачу или акушерку о симптомах СРК.

Производитель

ДИСТРИБЬЮТОР: «БИОКОДЕКС», Франция

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ / ИМПОРТЕР
ООО «БИОКОДЕКС Украины»**

пр. С. Бандеры 28А, литера Г г. Киев, Украина 04073

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «ПресижнБиотикс Лтд» (PrecisionBiotics Ltd)

Здание 4400, Бизнес Парк Аэропорта Корк, Кинсейл Роуд, Корк, Ирландия
(Building 4400, Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Ireland)

Упаковка

30 капсул по 250 мг (mg) вес нетто 7,5 г (g) □.

Условия хранения

Хранить при температуре ниже 25 ° С в сухом месте. **Альфлорекс® ВІД** СПК не нужно хранить в холодильнике.

Обязательно плотно закрывайте тару после каждого использования.

Не использовать продукт после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности касается неповрежденного и правильно сохраненного продукта.

Утилизировать упаковку соответствующим образом.