

## **Состав**

*действующее вещество:* dalargin;

1 мл раствора содержит даларгина 1 мг;

*вспомогательные вещества:* натрия хлорид, кислота уксусная, вода для инъекций.

## **Лекарственная форма**

Раствор для инъекций.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная, бесцветная жидкость.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, влияющие на пищеварительный тракт и метаболические процессы.  
Код АТХ А16А Х.

## **Фармакодинамика**

Даларгин - пептидное соединение (тирозин-2-аланил-глицин-фенилаланил-лейцил-аргинина диацетат), в структуру которого входят остатки 6 аминокислот. Даларгин относится к средствам, регулирующим метаболические процессы. Препарат ускоряет заживление язв желудка и двенадцатиперстной кишки, снижает кислотность желудочного сока за счёт антисекреторной активности. Даларгин имеет также гипотензивное влияние. Наблюдается положительное влияние даларгина на психические функции больных алкоголизмом.

## **Фармакокинетика**

Не исследовалась.

## **Показания**

В составе комплексной терапии: обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в случае длительного рубцевания язвы; облитерирующие заболевания нижних конечностей; нарушение психического состояния при алкоголизме; панкреатит, панкреанекроз.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, выраженная артериальная гипотензия.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Если существует выраженный болевой симптом, одновременно с препаратом Даларгин-Фармсинтез следует назначать антацидные средства.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не изучена.

Если во время лечения препаратом наблюдается головокружение, следует воздержаться от управления транспортными средствами или работ с другими механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности лекарственное средство противопоказано.

При необходимости лечения препаратом необходимо прекратить кормление грудью.

### **Способ применения и дозы**

Даларгин-Фармсинтез следует вводить внутримышечно и внутривенно.

*При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки или облитерирующих заболеваниях нижних конечностей* разовая доза препарата Даларгин-Фармсинтез составляет 1-2 мл (1-2 мг).

Внутримышечные инъекции вводят 2 раза в сутки, внутривенные - 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза (при внутримышечном введении) - до 5 мл (5 мг). Курс лечения длится 3-4 недели. Общая доза препарата Даларгин-Фармсинтез на курс лечения составляет 30-50 мг.

*При психических расстройствах алкогольного генеза* внутривенно вводить 1 мг даларгина в 10 мл 0,9 % раствора натрия хлорида для инъекций.

*При остром панкреатите* препарат вводить внутривенно: в первый день - 2 мл (2 мг), затем по 5 мл (5 мг) 1-2 раза в день. Курс лечения - от 4 до 6 дней.

*При панкреанекрозе* вводить внутривенно по 5 мл (5 мг) 3-4 раза в сутки (через 6-8 часов). Курс лечения - от 2 до 6 дней.

## **Дети**

Информация о безопасности и эффективности применения препарата Даларгин-Фармсинтез детям отсутствует, поэтому не рекомендуется назначать препарат этой возрастной категории пациентов.

## **Передозировка**

Не описана.

## **Побочные реакции**

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* снижение артериального давления, тахикардия, сердцебиение.

*Со стороны нервной системы:* головная боль, головокружение, онемение верхних конечностей и лица.

*Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:* учащение или затруднение дыхания, удушье.

*Со стороны иммунной системы:* аллергические реакции.

*Со стороны кожи и подкожных тканей:* зуд, гиперемия, крапивница, покраснение или жжение кожи лица, бледность кожных покровов, потливость.

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* тошнота, боль в животе, включая боль в эпигастрии.

*Общие нарушения и реакции в месте введения:* общая слабость, озноб, повышение температуры тела, боль за грудиной, отек лица; гиперемия, сыпь, зуд в месте введения.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

**Упаковка**

По 1 мл в ампулах, по 5 ампул в 1 блистере, по 2 блистера в коробке.

**Категория отпуска**

По рецепту.

**Производитель**

ЧАО «ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).