

## **Состав**

*действующие вещества:* каждая пастилка содержит экстракт адхатоды сосудистой листьев густого (Adhatoda vasica) (4 ~ 5: 1) (экстрагент вода) - 30,0 мг, экстракта солодки голой корней густого (Glycyrrhiza glabra) (4 ~ 5: 1) (экстрагент вода) - 7,0 мг, экстракта перца длинного плодов густого (Piper Longum) (4 ~ 5: 1) (экстрагент вода) - 6,0 мг, экстракта фиалки душистой цветков густого (Viola odorata) (4 ~ 5: 1) (экстрагент вода) - 2,0 мг, экстракта иссопа лекарственного листьев густого (Hyssopus officinalis) (4 ~ 5: 1) (экстрагент вода) - 3,0 мг, экстракта калгана большого корневищ густого (Alpinia galanga) (4 ~ 5: 1) (экстрагент вода) - 3,0 мг, экстракта мяты перечной листья густого (Mentha piperita) (4 ~ 5: 1) (экстрагент вода) - 2,0 мг.

*вспомогательные вещества:* ментол, масло эвкалиптовое, сахароза, глюкозы раствор, тальк, парафин, воск желтый, ланолин, парафин белый мягкий, масло минеральное.

## **Лекарственная форма**

Пастилки.

*Основные физико-химические свойства:* круглые пастилки коричневого цвета со вкусом мяты.

Нижние и верхние поверхности пастилок имеют неровности. В карамельной массе допускаются включения мелких воздушных пузырьков. На поверхности пастилок возможно наличие незначительного белого налета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код ATX R05X.

## **Фармакодинамика**

Комплексный препарат на основе лекарственных трав с противовоспалительными, отхаркивающими, муколитическими,

спазмолитическим и жаропонижающими свойствами. Активирует секреторную функцию эпителия дыхательных путей, изменяет поверхностно-активные свойства легочного сурфактана, стимулирует функцию ворсинок эпителия, что положительно влияет на экссудативную и полиферативную фазы воспаления. Разжижает густую мокроту и облегчает отхождение слизи из дыхательных путей. На слизистые оболочки глотки и бронхов действует как местный антисептик, защищает их от воздействия патогенных микроорганизмов. Применение препарата снижает тонус гладких мышц бронхиол и трахеи, увеличивает размер бронхиол и альвеолярных мешочек, уменьшает отеки слизистых оболочек. Изменения выраженности кашля отмечаются через 3-4 дня применения препарата.

Адхатода сосудистая - содержит алкалоид вазицин, что обеспечивает антисептические свойства Линкас и обладает отхаркивающим действием.

Солодка голая - отхаркивающее, спазмолитическое, широкое противоспалительное действие.

Перец длинный - эффективен при лечении кашля, бронхиальной астмы, коклюша.

Фиалка душистая - отхаркивающее, противовоспалительное, antimикробное, мочегонное, болеутоляющее, успокаивающее действие.

Иссоп лекарственный - оказывает антисептическое, противокашлевое действие. Стимулирует пищеварение и снимает спазм гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта.

## **Показания**

Симптоматическая терапия воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся сухим раздражающим кашлем и болью в горле, а именно: бронхита (острого и хронического) фарингита, трахеита, трахеобронхита.

## **Противопоказания**

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к его составляющим, сахарном диабете, органических поражениях сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), артериальной гипертензии; нарушениях функции печени и почек; гипокалиемии; тяжелой степени ожирения, бронхиальной астме.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми лекарствами (например, с кодеином), которые уменьшают выход мокроты. При необходимости применения каких-либо других лекарственных средств следует сообщить врачу.

## **Особенности применения**

В состав препарата входит сахар, на что необходимо обратить внимание больным сахарным диабетом и пациентам, находящимся на гипокалорийной диете. Пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом(изжогой) следует избегать применения препарата из-за содержания мяты перечной листья, так как может увеличиться изжога.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не оказывает влияния на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применять в период беременности и кормления грудью противопоказано, поскольку солодка голая, которая входит в состав лекарственного средства, повышает уровень эстрогенов, вследствие чего нарушается гормональный баланс. В случае необходимости приема препарата в период кормления грудью, кормление грудью следует прекратить.

## **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям старше 5 лет медленно рассасывать до полного растворения по 1 пастилке каждые 2-3 часа. Максимальная суточная доза - 8 пастилок.

Продолжительность лечения - 3-5 дней.

## **Дети**

Препарат не назначать детям до 5 лет.

## **Передозировка**

Передозировка и длительное применении (более 2 месяцев) может вызвать нарушение водно-электролитного баланса, в результате чего возможно развитие гипокалиемичной миопатии и миоглобинурии. Возможно усиление побочных эффектов. Сообщений о случайной передозировке не поступало.

## **Побочные реакции**

При применении препарата возможны слабость, повышение артериального давления, гипокалиемия, аллергические реакции (в том числе высыпания (макулезно сыпь), гиперемия кожи, анулярный эритема, зуд, крапивница, ангионевротический отек).

*В случае возникновения каких-либо необычных реакций прекратить прием препарата и обратиться к врачу.*

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 8 пастилок в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

Хербион Пакистан Прайвэт Лимитед / Herbion Pakistan Private Limited.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

LF-37/A-3, Промышленная зона Ландхи, Карачи, Пакистан/ LF-37/A-3, Landhi Industrial area, Karachi, Pakistan.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины.](#)