

## **Состав**

*действующие вещества:* 10 мл суспензии содержат 500 мг натрия альгината, 213 мг натрия гидрокарбоната, 325 мг кальция карбоната;

*вспомогательные вещества:* карбомер 974Р, метилпарабен (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), сахарин натрия, ароматизатор мяты перечной № 2, натрия гидроксид, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Суспензия оральная

*Основные физико-химические свойства:* вязкая, непрозрачная, от почти белого до кремового цвета суспензия с запахом мяты.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Лекарственные средства для лечения язвенной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Код АТХ А02В Х.

## **Фармакодинамика**

Лекарственное средство представляет собой комбинацию двух антацидов (кальция карбоната и гидрокарбоната натрия) и натрия альгината, который оказывает адсорбирующее и обволакивающее действие.

После приема препарат быстро вступает в реакцию с желудочной кислотой, образуя массу из геля альгиновой кислоты, имеющий почти нейтральное значение рН и покрывает поверхность содержимого желудка, эффективно предотвращая проявления гастроэзофагеального рефлюкса. В серьезных случаях слой геля, предваряя содержимого желудка, поднимается в пищевод и предотвращает его раздражение. Карбонат кальция нейтрализует желудочную кислоту и обеспечивает быстрое облегчение при расстройствах пищеварения и изжоги. Этот эффект усиливается благодаря гидрокарбоната натрия, также оказывает нейтрализующее действие. Общая нейтрализующий способность препарата при низкой дозе 10 мл составляет около 10 мЕкв Н +.

## **Фармакокинетика**

Механизм действия этого лекарственного средства является физическим и не зависит от абсорбции в системный кровоток.

## **Показания**

Лечение симптомов гастроэзофагеального рефлюкса, связанных с кислотностью желудочного содержимого, что забрасывается в пищевод, таких как кислая отрыжка, изжога, расстройство пищеварения, например, после приема пищи или во время беременности.

## **Противопоказания**

Лекарственный препарат противопоказан пациентам с известной или подозреваемой гиперчувствительностью к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ, в том числе метилпарагидроксибензоат (E218) и пропилпарагидроксибензоат (E216).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

В связи с наличием кальция карбоната, который действует как антацид, необходимо выдерживать 2-часовой интервал между приемом препарата Гавискон® Двойного действия, суспензии оральной и приемом других лекарственных средств, особенно H<sub>2</sub>-антигистаминных препаратов, тетрациклинов, дигоксина, фторхинолона, солями железа, кетоконазол, нейролептиков, тироксина, пеницилламину, бета-блокаторов (атенолол, метопролол, пропранолол), глюкокортикоидов, хлорохинолу, дифосфонатов и эстрамустина.

## **Особенности применения**

20 мл препарата содержат 255,76 мг (11,12 ммоль) натрия, что эквивалентно 12,79% максимального суточного потребления натрия для взрослых, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.

Максимальная суточная доза эквивалентна 51,15% максимального суточного потребления натрия, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.

Этот препарат имеет высокое содержание натрия, необходимо учитывать

больным, придерживаются низкосолевой диеты, в частности, при заболеваниях почек или застойной сердечной недостаточности.

20 мл суспензии содержат 260 мг (6,5 ммоль) кальция. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующим образованием почечных камней, содержащих кальций.

В случае отсутствия улучшения симптоматики через 7 дней лечения, клиническая ситуация требует пересмотра.

Прием препарата может маскировать симптомы других серьезных заболеваний.

Лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно отсроченные).

Флакон стеклянный - обращаться осторожно! Не пить непосредственно из флакона.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Гавискон® Двойного действия, суспензия оральная, не влияют на течение беременности, внутриутробное и постнатальное развитие ребенка. Препарат можно применять беременным и в период кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Лекарственное средство предназначено для перорального применения

Взрослые и дети старше 12 лет принимают по 10-20 мл (2-4 чайные ложки) после еды и перед сном, всего в 4 раз в сутки. Перед применением взболтать.

*Особые категории пациентов:*

Не требуется коррекция дозы пациентам пожилого возраста.

Пациенты с нарушением функции печени не требуются коррекции дозы

Почечная недостаточность: принимать с осторожностью больным, придерживаются низкосолевой диеты (см. Раздел «Особенности применения»).

## **Дети**

Не рекомендуется детям до 12 лет.

## **Передозировка**

### *Симптомы*

Симптомы бывают незначительными при острой передозировке. Передозировка может проявляться в виде дискомфорта и вздутия в животе. Молочно-щелочной синдром развивался у лиц, принимавших высокие суточные дозы кальция карбоната в течение длительного периода.

### *Лечение*

При передозировке необходимо прекратить применение препарата и провести симптоматическую терапию.

## **Побочные реакции**

*Побочные реакции классифицированы по частоте следующим образом:*

очень часто (1/10), часто (от 1/100 до <1/10), нечасто (от 1/1000 до <1/100), редко (от 1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10000) и частота неизвестна (не подлежит оценке с учетом имеющиеся данные).

### *Со стороны иммунной системы*

Очень редко анафилактические и анафилактоидные реакции, реакции гиперчувствительности, такие как крапивница.

### *Со стороны обмена веществ и нарушение пищеварения*

Частота неизвестна: алкалоз, кислотный рикошет, гиперкальциемия, молочно-щелочной синдром.

*Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения*

Очень редко проявления со стороны дыхательной системы, такие как бронхоспазм.

*Со стороны пищеварительного тракта*

Частота неизвестна: запор.

*Описание отдельных побочных реакций*

Как правило, такие симптомы возникают вследствие превышения рекомендуемой дозы.

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте. Не хранить в холодильнике но не замораживать.

### **Упаковка**

По 24 саше в упаковке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Дэнсом Лейн, Халл, HU8 7DS, Великобритания/

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United Kingdom.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).