

Состав

действующее вещество: симетикон;

1 мл суспензии содержит симетикона 40 мг;

вспомогательные вещества: сахарин натрия, гидроксипропилметилцеллюлоза, ароматизатор апельсиновый, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), вода очищенная.

Лекарственная форма

Суспензия оральная.

Основные физико-химические свойства: однородная полупрозрачная суспензия без видимых включений с апельсиновым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах. Силиконы.

Код АТХ А03А Х13.

Фармакодинамика

Симетикон - стабильный поверхностно-активный полиметилоксан, пеногаситель. Он изменяет поверхностное натяжение пузырьков газа, образующихся в содержимом желудка и слизистые кишечника, и таким образом они распадаются или объединяются, что облегчает их выведение. Освободившиеся газы всасываются стенкой кишки или удаляются благодаря перистальтике кишечника. Симетикон удаляет пузырьки газа только физическим путем, не вступает в химические реакции и является химически инертным.

Фармакокинетика

Симетикон не всасывается при пероральном приеме и выводится кишечником в неизменном виде.

Показания

Симптоматическое лечение при жалобах со стороны желудочно-кишечного тракта, связанных с газообразованием, например боль в животе, колики, вздутие,

метеоризм.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к симетикону или к любому из вспомогательных веществ.
- Непроходимость кишечника, обструктивные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Левотироксин может связываться с симетиконом. Абсорбция левотироксина в кишечнике может быть нарушена при одновременном применении с симетиконом.

Особенности применения

Не следует применять препарат Инфакол без консультации врача, если ребенок проходит лечение заболевания щитовидной железы.

Метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216), входящих в состав лекарственного средства Инфакол, могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).

Если симптомы не проходят, следует обратиться к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не применять.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применять.

Способ применения и дозы

Применять детям до 1 года по 20 мг (0,5 мл) перед каждым кормлением, при необходимости дозу можно повысить до 40 мг (1 мл). Лечение Инфаколом обеспечивает постепенное улучшение симптомов в течение нескольких дней. Продолжительность лечения зависит от наличия жалоб и определяется индивидуально.

Дети

Лекарственное средство применять детям до 1 года.

Передозировка

В настоящее время неизвестны токсические эффекты после применения симетикона. При использовании доз, превышающих рекомендуемые, следует обратиться к врачу. В случае умышленного или случайного передозировки применяют симптоматическое лечение.

Побочные реакции

Не исключена возможность возникновения кожной сыпи, зуда, гиперемии. Может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).

Сообщение о подозреваемых побочных реакции

Сообщение о подозреваемых побочных реакции после регистрации лекарственного средства важны. Это позволяет осуществлять мониторинг соотношения «польза / риск» при применении лекарственного средства. Медицинские работники должны сообщать обо всех подозреваемых побочных реакции.

Срок годности

2 года.

Не применять лекарственное средство после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

Флакон по 50 мл суспензии с капельным дозатором. По 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Пурна Фармасьютикалз НВ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Рийксвег 17 Пуурс, 2870, Бельгия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).