

## **Состав**

*действующее вещество:* симетикон;

1 капсула мягкая содержит симетикон 120 мг;

*вспомогательные вещества:* желатин, глицерин, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Капсулы мягкие.

*Основные физико-химические свойства:* овальные капсулы с природной прозрачной оболочкой и маслянистым опалесцирующим содержимым.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при функциональных кишечных расстройствах. Силиконы. Код АТХ А03Х13.

## **Фармакодинамика**

Симетикон представляет собой физиологически инертное вещество, поэтому является фармакологически неактивным. Действует, изменяя поверхностное натяжение пузырьков газа и вызывая их соединение.

## **Фармакокинетика**

Симетикон после перорального применения не всасывается в желудочно-кишечном тракте и выводится из организма в неизмененном виде.

## **Показания**

Симптоматическое лечение вздутия живота (метеоризма).

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ. Полная кишечная непроходимость. Обструктивные болезни желудочно-кишечного тракта.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Левотироксин может связываться с симетиконом. Абсорбция левотироксина в кишечнике может быть нарушена при одновременном приеме с симетиконом. Исследования взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводились.

### **Особенности применения**

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, а также в случае продолжительных запоров, пациент должен обратиться к врачу.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Данных по применению симетикона беременными нет. Данных относительно репродуктивной токсичности препарата, полученных в ходе проведения исследований на животных, недостаточно.

Хотя симетикон не всасывается в желудочно-кишечном тракте и физиологически неактивен, Мотилигас в период беременности следует назначать только тогда, когда, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода.

Симетикон не выделяется в грудное молоко.

### **Способ применения и дозы**

Для перорального применения.

*Взрослые:* рекомендуемая доза – не более 4 капсул в сутки.

Принимать по одной капсуле после каждого основного приема пищи, запивая стаканом воды.

Продолжительность лечения составляет не больше 10 дней.

### **Дети**

Мотилигас не рекомендуется для применения детям из-за отсутствия соответствующей информации.

## **Передозировка**

Никакого случая передозировка не зарегистрирована. В случае применения доз больше, чем рекомендовано, следует обратиться к врачу.

## **Побочные реакции**

Частоту возникновения побочных реакций определяют следующим образом: очень частые –  $^31/10$ ; частые – от  $^31/100$  до  $< 1/10$ ; нечастые – от  $^31/1000$  до  $<1/100$ ; жидкие – от  $^31/10\ 000$  до  $<1/1000$ ; очень редкие –  $<1/10\ 000$ , частота неизвестна: на основе доступных данных частоту оценить невозможно.

*Со стороны иммунной системы:* частота неизвестна – реакции гиперчувствительности, такие как сыпь на коже, зуд, отек лица или языка, затрудненное дыхание.

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* частота неизвестна – тошнота, рвота, запор.

При появлении нежелательных реакций следует прекратить лечение и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Не требует специальных условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 10 мягких капсул в блистере; по 4 блистера в картонной упаковке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

Каталент Франсе Бенайм СО.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

74 рю принсиполь 67930 Бенайм, Франция.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).