

## **Состав**

*действующее вещество:* glycerol;

1 суппозиторий содержит глицерина 86% 0,75 г;

*вспомогательные вещества:* кислота стеариновая, натрия карбонат безводный.

## **Лекарственная форма**

Суппозитории.

*Основные физико-химические свойства:* белые или почти белые, полупрозрачные, гигроскопичные суппозитории.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Слабительные средства. Глицерин. Код АТХ А06АХ01.

## **Фармакодинамика**

В чистом виде глицерин имеет раздражающее действие, исчезает при добавлении воды (до 30-50%), вазелина, ланолина. При введении в прямую кишку суппозитории оказывают легкую раздражающее действие на слизистую оболочку и рефлекторным путем стимулируют дефекацию. При применении в виде ректальных суппозиториях облегчает выведение каловых масс.

## **Показания**

Запоры различной этиологии (когда применение пероральных препаратов невозможно).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Кишечная непроходимость, почечная недостаточность, аппендицит, кровотечения, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания, опухоли прямой кишки, недиагностированный боль в животе.

## *Особые меры безопасности*

Не рекомендуется применять суппозитории курсом лечения более 1 недели.

С осторожностью применять при нарушении функции почек, аллергии, тошноте, рвоте.

До и после применением суппозиториев следует тщательно вымыть руки.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Суппозитории с глицерином могут ослабить действие других лекарств, которые применяются ректально. Необходимо соблюдать многочасового интервала.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности препарат можно применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Неизвестно, выделяется глицерин в грудное молоко, поэтому препарат врач может назначать только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

### **Способ применения и дозы**

По 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15-20 мин после завтрака.

Суппозиторий вводят в прямую кишку и держат там в течение не менее 5 мин, если не происходит опорожнение раньше. Остатки суппозиториев выводятся из организма вместе с калом. При необходимости дозу можно увеличить до 2 суппозиториев в сутки.

Взрослым и детям старше 5 лет назначают по 1 суппозиторию (который включает 1,5 г глицерина) 1 раз в сутки. Детям до 5 лет-1 суппозиторий (содержащий 0,75 г глицерина) 1 раз в сутки.

### **Дети**

Нет ограничений.

### **Передозировка**

В случае передозировки возможно частое опорожнение кишечника, жидкий стул. Это явление проходит само собой после отмены препарата.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции боль, тошнота, рвота, желудочно-кишечное кровотечение.

При длительном применении наблюдались раздражение и неприятные ощущения в прямой кишке; иногда катаральный проктит.

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 5 суппозитория в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Фармина Лтд.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Ул. Липски, 44, 30-721 Краков, Польша.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).