

## **Состав**

действующее вещество: simethicone;

1 таблетка содержит симетикона 125 мг;

*вспомогательные вещества:* магния-алюминия силикат, лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, кальция гидрофосфат, кислота стеариновая, кремния диоксид коллоидный, кросповидон, повидон К 29/32, Opadry II 85G 52218 желтый.

## **Лекарственная форма**

Таблетки, покрытые оболочкой.

*Основные физико-химические свойства:* овальные, гладкие с обеих сторон таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах. Силиконы.

Код АТХ А03А Х13.

## **Фармакодинамика**

Симетикон, который входит в состав препарата, - это нетоксичное инертное поверхностно-активное вещество, изготовленное на основе кремния, является пеногасителем. Он изменяет поверхностное натяжение пузырьков газа, образующихся в кишечнике, и вызывает их разрушение. Газы, которые высвобождаются при этом, могут как поглощаться стенками кишечника, так и выводиться из организма благодаря перистальтике кишечника. Применение симетикона к началу диагностических исследований органов брюшной полости предупреждает возникновение дефектов изображения, вызванных пузырьками газа; способствует тщательному орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастным веществом, что предотвращает разрыв контрастной пленки даже в случае вздутия кишечника.

## **Фармакокинетика**

Симетикон действует исключительно на поверхности пузырьков газа и не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта. Симетикон не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта и после приема выводится в неизмененном виде. Симетикон не оказывает центрального действия.

## **Показания**

1. Симптоматическое лечение нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, связанных с газообразованием, например, метеоризм, в том числе в послеоперационный период.
2. Как вспомогательное средство при проведении диагностических исследований органов брюшной полости (рентгенография, ультразвуковое исследование) и при подготовке к гастродуоденоскопии.
3. Как пеногаситель при интоксикациях поверхностно-активными веществами (стиральными порошками или другими моющими средствами).

## **Противопоказания**

1. Повышенная чувствительность к препарату и к его компонентам.
2. Кишечная непроходимость.
3. Обструктивные заболевания пищеварительного тракта.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Одновременное применение симетикона и слабительных средств, содержащих минеральное масло (парафин), не рекомендуется, так как смешивание этих веществ приводит к уменьшению эффективности симетикона.

Левотироксин может связываться с симетиконом. Абсорбция левотироксина в кишечнике может быть нарушена при одновременном приеме с симетиконом.

## **Особенности применения**

Если симптомы (жалобы) со стороны желудочно-кишечного тракта появляются повторно или продолжаются более 14 дней или усиливаются, следует обратиться за консультацией к врачу.

Препарат содержит лактозу. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Поскольку симетикон является инертным веществом, не абсорбируется, влияние на управление автотранспортом или другими механизмами практически исключен.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Клинических данных по применению препарата Коликид® беременными нет. Поскольку активный компонент не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта, не следует ожидать какого-либо действия лекарственного препарата на плод или накопления препарата в грудном молоке.

Применение препарата Коликид® в период беременности и кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

## **Способ применения и дозы**

Таблетки Коликид применять внутрь взрослым и детям старше 12 лет. Прием препарата не зависит от приема пищи.

*Симптоматическое лечение при жалобах со стороны желудочно-кишечного тракта:* по 1 таблетке 3 раза в сутки.

*Как вспомогательное средство при проведении диагностических исследований органов брюшной полости:* по 1 таблетке 3 раза в сутки за день до исследования и еще 1 таблетку - утром в день его проведения.

*Как пеногаситель при интоксикациях поверхностно-активными веществами (стиральными порошками или другими моющими средствами):* дозировка зависит от тяжести интоксикации. Минимальная рекомендуемая доза - 3 таблетки.

Продолжительность курса лечения устанавливается индивидуально. В случае необходимости препарат можно принимать длительное время.

## **Дети**

Коликид, таблетки, применять детям в возрасте от 12 лет.

Детям до 12 лет препарат назначать в виде жидких лекарственных форм.

## **Передозировка**

К этому времени случаи передозировки неизвестны. Поскольку симетикон в химическом и физиологическом отношении инертен, то интоксикация практически исключена. В случае применения доз больших, чем рекомендовано, следует обратиться к врачу.

## **Побочные реакции**

*Со стороны иммунной системы:* аллергические реакции, реакции повышенной чувствительности, такие как зуд, сыпь, крапивница, отек лица, отек языка и затрудненное дыхание.

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* тошнота, запор.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 15 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной упаковке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ООО «Кусум Фарм».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

40020, Украина, Сумская область, м. Сумы, ул. Скрябина, 54

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).