

Состав

1 таблетка массой 1000 мг (mg):

действующие ингредиенты: пробиотик Streptococcus salivarius K 12 (не менее 1 млрд колониеобразующих единиц);

вспомогательные вещества: мальтодекстрин, диоксид кремния и подсластитель (фруктоза), ароматизатор (клубника).

Характеристика

Бактоблис содержит в составе пробиотик Streptococcus salivarius BLIS K 12 восстанавливает бактериальный баланс ротовой полости и верхних дыхательных путей за счет быстрого колонизации, на третий день. Уникальная и редкая свойство штамма Streptococcus salivarius BLIS K 12 одновременно высвобождение 2 бактериоцинов (саливарицин A2, саливарицин B), принадлежащих к классу лантибиотиков - агентов, ограничивающие рост многочисленных видов патогенных бактерий, таких как: Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Micrococcus luteus, Streptococcus anginosus, Eubacterium saburreum, Micromonas micros и др. - есть установленной.

Рекомендації щодо застосування

Как дополнительный источник пробиотика Streptococcus salivarius BLIS K12 с целью создания оптимальных условий для поддержания нормального микробиоценоза микрофлоры, устойчивости организма (резистентности) к инфекциям верхних дыхательных путей в период сезонных заболеваний, предупреждения бактериальных и вирусных заболеваний, после курса антибиотиков с целью восстановления естественной микрофлоры слизистой ротовой полости и верхних дыхательных путей.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Превышать рекомендуемую суточную норму. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 3х лет рекомендуется рассасывать по 1 таблетке в сутки во рту до полного растворения, желательно в вечернее время перед сном, после чистки зубов. Для детей, которые не могут рассасывать, следует измельчить таблетку. в порошкообразной формы и нанести на десны в той же дозе, не запивая жидкостью.

После применения не рекомендуется принимать пищу или воду в течение 30 минут.

Срок применения: от 10 дней. Курс применения более 90 дней должен быть согласован с врачом.

Для предупреждения бактериальных заболеваний ротовой полости и верхних дыхательных путей: по 1 таблетке в сутки в течение 30 дней.

Для устранения неприятного запаха изо рта по 1 таблетке в сутки в течение 10-15 дней.

Срок годности

2 года от даты производства.

Условия хранения

Хранить в сухом, прохладном, недоступном для детей месте при температуре от 2 ° С до 8 ° С. Транспортировать возможно при температуре не превышающей 25 ° С в течение не более 48 часов.

Упаковка

1 блистер по 10 таблеток, в картонной упаковке.

Производитель

Medico domus с.о.о., Сербия (производственные мощности).

Bluestone Pharma, Швейцария.