

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 флакон содержит настойки мяты перечной (*Menthae piperitae folium*) (1: 20) (экстрагент - этанол 90%) 25 мл;

*вспомогательные вещества:* масло мяты перечной.

## **Лекарственная форма**

Настойка.

*Основные физико-химические свойства:* жидкость от зеленого до зелено-бурого цвета, с запахом мяты перечной. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту. Код АТХ А04А D.

## **Фармакодинамика**

Масло мяты перечной (содержит до 70% ментола и его эфиров) и другие биологически активные вещества, содержащиеся в листьях мяты перечной (кетоны-ментон, олеаноловая и урсоловая кислоты, флавоноидные гликозиды), стимулируют чувствительные рецепторы слизистых оболочек ротовой полости и желудка, рефлекторным путем уменьшают чувство тошноты и предотвращают рвоту, а также оказывают умеренное спазмолитическое, успокаивающее и желчегонное действие.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

Тошнота, рвота, расстройства пищеварения, стенокардия, невралгические боли.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Бронхиальная астма и спазмофилия.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не выявлено.

## **Особенности применения**

Пациентам с желудочно-пищеводного рефлюкса (изжогой) следует избегать применения препарата, поскольку может увеличиться изжога.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Следует иметь в виду, что в состав препарата входит этиловый спирт, поэтому следует воздерживаться от управления автотранспортом или работы с потенциально опасными механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Мяты перечной настойка содержит спирт этиловый, поэтому не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

Препарат принимают внутрь до еды. Взрослым и детям старше 12 лет назначать по 10-15 капель настойки 3-4 раза в день.

Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и индивидуальной чувствительности к препарату.

## **Дети**

Не рекомендуется применять «Мяты перечной настойку» детям до 12 лет из-за содержания спирта этилового, входящий в состав препарата.

## **Передозировка**

Нерациональное применение препаратов мяты может привести к боли в области сердца.

Терапия симптоматическая.

## **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, контактный дерматит).

При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 25 мл в флаконе.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ООО «Тернофарм».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 46010, г.. Тернополь, ул. Фабричная, 4

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).