

Состав

действующее вещество: 100 г пасты содержит гидрогель метилкремниевой кислоты 70 г

вспомогательные вещества: вода очищенная.

Лекарственная форма

Паста для перорального применения.

Основные физико-химические свойства: однородная пастоподобная масса белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Энтеросорбенты. Код АТХ А07В С.

Фармакодинамика

Энтеросгель – инертное кремний-органическое соединение. При применении обладает сорбционным действием. Препарат эффективно адсорбирует среднемолекулярные токсические вещества экзо- и эндогенного происхождения, продукты незавершенного метаболизма, инкорпорированные радионуклиды и естественным путем выводит их из организма.

Энтеросгель устраняет проявления токсикоза, улучшает функцию кишечника, печени, почек, нормализует показатели крови и мочи.

Фармакокинетика

Обволакивая слизистую оболочку желудка и кишечника, Энтеросгель защищает ее от эрозивных процессов, способствует повышению локального иммунитета.

Энтеросгель не всасывается из кишечника и не претерпевает метаболических или химических превращений.

Показания

В составе комплексной дезинтоксикационной терапии при хронической почечной недостаточности; при токсическом гепатите, вирусном гепатитах А, В, циррозе печени и холестазах различного генеза; при энтероколитах, колитах, диарее, гастритах с пониженной кислотностью; при отравлении алкоголем и

наркотическими средствами; при аллергических и кожных заболеваниях (диатезы, нейродермиты); при ожоговой интоксикации; гнойно-септических и воспалительных процессах, которые сопровождаются интоксикацией; токсикозах беременных первой половины беременности, в комплексной терапии дисбактериоза кишечника.

Противопоказания

Острая кишечная непроходимость.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат может уменьшать действие других лекарственных средств, которые применяются вместе с ним. Не рекомендуется одновременный прием с препаратами, относящимися к классу секвестрантов желчных кислот, например холестирамин, вследствие усиления вероятности развития запоров.

Препарат не следует применять совместно с препаратами серебра.

Особенности применения

При условии соблюдения способа применения (Энтеросгель и лекарственные средства принимают с интервалом 1,5-2 часа), препарат можно применять в комплексной терапии с другими лекарственными и профилактическими средствами, в том числе с пребиотиками и пробиотиками (бифидум-, лактобактерии), фитопрепаратами, адаптогенами, иммуномодуляторами.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат можно применять при беременности и в период кормления грудью. Следует ограничить применение у беременных, склонных к развитию запоров.

Способ применения и дозы

Применять внутрь 3 раза в сутки за 1,5-2 часа до или через 2 часа после пищи или приема лекарственных средств, запивая достаточным количеством воды.

Для взрослых и детей старше 14 лет разовая доза препарата составляет 15 г (столовая ложка), суточная доза – 45 г.

Для детей с рождения до 5 лет: разовая доза препарата составляет 5 г (чайная ложка), суточная доза – 15 г; от 5 до 14 лет: разовая доза – 10 г (десертная ложка), суточная доза – 30 г.

Курс лечения – от 7 до 14 суток.

При тяжелых формах заболеваний на протяжении первых трех суток возможно применение двойной разовой дозы, а при хроническом течении болезни (хроническая почечная недостаточность) возможно более продолжительное (до 1 месяца) применение препарата.

Дети

Препарат применяют детям с рождения. Детям в возрасте до 2 лет перед применением разовую дозу препарата смешивают с небольшим количеством воды.

Передозировка

Случаев передозировки препарата не описано. При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

При приеме препарата возможны диспепсические явления. В первые дни приема препарата возможно развитие запора. Для его предотвращения людям, склонным к запору, в первые два дня приема препарата рекомендуется очистительная клизма на ночь или применение слабительных средств (лактолоза, пикосульфат натрия).

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С, не допускать замораживания. После замораживания теряет свои свойства. После вскрытия упаковки хранить при тех же самых условиях в плотно закрытой таре.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 135 г в контейнере; по 1 контейнеру в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПрАО «ЭОФ «КРЕОМА-ФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

03680, Украина, г. Киев, ул. Радищева, 3.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).