

Состав

действующие вещества: 19,55 г порошка содержат: алтейного корня экстракта сухого (*Althaeae radix extractum siccum*) - 4,0 г; натрия гидрокарбоната - 2,0 г; солодкового корня экстракта сухого (*Glycyrrhizae radix extractum siccum*) - 1,0 г; аммония хлорида - 0,5 г; анисового масла - 0,05 г;

вспомогательные вещества: натрия бензоат, сахар кондитерский.

Лекарственная форма

Порошок.

Основные физико-химические свойства: порошок от светло-бежевого до буровато-серого цвета с запахом масла анисового. В процессе хранения возможно взбивания порошка в комочки или образования твердой пористой массы, должны распадаться при разведении водой. Водная суспензия препарата (1:10) имеет окраску от светло до темно-коричневого.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее, секретомоторное средство.

Код АТХ R05C A10.

Фармакодинамика

Препарат стимулирует отхаркивание. Механизм действия обусловлен облегчением отделение слизи, улучшением его вывода (увеличение мукоцилиарного).

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Препарат применять как противокашлевое, противовоспалительное и отхаркивающее средство в комплексном лечении воспалительных заболеваний дыхательных путей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), артериальная гипертензия, нарушение функции печени и почек; гипокалиемия тяжелая степень ожирения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Одновременное применение с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, адренокортикостероидами и слабительными средствами может усилить гипокалиемию.

Не рекомендуется применять вместе с противокашлевыми средствами.

Особенности применения

«Ариду сухую микстуру от кашля для детей» следует назначать в комплексной терапии. Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется при приеме отхаркивающих, особенно секретомоторных препаратов назначать внутрь большое количество теплой жидкости. Больным сахарным диабетом следует проконсультироваться с врачом перед применением препарата.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат применять детям в возрасте от 1 до 18 лет. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат применять детям в возрасте от 1 до 18 лет. В период беременности и кормления грудью лечение назначает врач при условии, что предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

Перед применением порошок разводить кипяченой охлажденной водой до метки на флаконе (200 мл).

Назначать внутрь после еды, детям в возрасте от 1 до 6 лет - по 1 чайной ложке микстуры 4-5 раз в сутки, детям старше 6 лет - по 1 десертной ложке 3-4 раза в

сутки. Перед употреблением микстуру взбалтывать. Разведенный порошок хранить в течение 10 дней при температуре не выше 8 °С.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от достигнутого эффекта и характера комплексной терапии.

Дети

Рекомендуется к применению детям от 1 до 18 лет.

Передозировка

Тошнота, рвота. Передозировка и длительное применение (более 2 месяцев) может вызвать нарушение водно-электролитного баланса, в результате чего возможно развитие гипокалиемической миопатии и миоглобинурии. Возможно усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

Длительное применение препаратов солодки в чрезмерных дозах может вызвать нарушение водно-электролитического баланса и привести к развитию гипокалиемии; в отдельных случаях возможны повышение артериального давления, гипокалиемической миопатия и миоглобинурия.

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд); гиперемия, отек усиленное слюноотделение, раздражение слизистой оболочки желудка.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

1 год.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 19,55 г во флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).