

## **Состав**

*действующее вещество:* pyrantel;

1 мерная ложка (2,5 мл) суспензии содержит пирантела эмбонат эквивалентно пирантела 125 мг;

*вспомогательные вещества:* сорбита раствор, кристаллизуется; глицерин полисорбат 80 лецитин; повидон, лимонная кислота; натрия бензоат (E 211) силикона эмульсия; ароматизатор карамель/черная смородина; алюминия-магния силикат; вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Суспензия оральная.

*Основные физико-химические свойства:* гомогенная жидкость светло-желтого цвета с характерным запахом. При возникновении седиментации частицы легко возвращаются в взвешенное состояние.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты.

Противогельминтные средства. Средства, применяемые при нематодозов.

Производные тетрагидропиримидину. Пирантел. Код АТХ P02C C01.

## **Фармакодинамика**

Пирантел является противогельминтное средством. Активный против *Enterobius vermicularis*, *Ascaris lumbricoides*, *Ancylostoma duodenale* и *Necator americanus*.

Пирантел приводит к нейро-мышечной блокады, парализуя гельминтов, в результате чего они выводятся путем кишечной перистальтики вместе с калом.

Пирантел является активным против чувствительных половозрелых и неполовозрелых форм гельминтов. Не влияет на личинки гельминтов, мигрируют через ткани.

## **Фармакокинетика**

Кишечная резорбция пирантела очень низкая. После приема препарата концентрация в плазме крови очень низкая (0,05-0,13 мкг/мл) и достигает максимума в течение 1-3 часов. До 93% выводится в неизменном виде с калом. Менее 7% обнаруживается в моче в неизменном виде и в виде метаболитов.

## **Показания**

Энтеробиоз, аскаридоз, анкилостомоз.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к любым компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не применять с пиперазином, который является антагонистом протигельминтного действия пирантела.

## **Особенности применения**

В случае печеночной недостаточности рекомендуется уменьшить дозу.

*Энтеробиоз.* Для предотвращения повторного заражения необходимо принимать строгие гигиенических мероприятий: проводить ежедневный туалет перианальной области, чистить ногти несколько раз в день. Детям необходимо коротко обрезать ногти. Регулярно менять нижнее белье и пижаму. Предотвращать расчесы. Рекомендуется одновременно лечить всех членов семьи, поскольку заражение часто протекает бессимптомно.

Данное лекарственное средство содержит сорбит. Не следует его применять пациентам, страдающим непереносимостью фруктозы (редкое наследственное заболевание). Сорбит также может проявлять незначительный слабительный эффект.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Если во время лечения наблюдается головокружение или сонливость, следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Из-за отсутствия тератогенного эффекта у животных врожденные пороки развития у людей не ожидаются. На сегодня клинически подтверждено врожденных пороков развития или фетотоксического эффектов. Однако мониторинг применения пирантела в период беременности недостаточен для

исключения всех возможных рисков. Таким образом, данный препарат может быть применен в период беременности только в случае крайней необходимости, после тщательной оценки соотношения польза для/риск для плода, которое определяет врач.

В связи с отсутствием опубликованных исследований нежелательное действие пирантела на детей, находящихся на грудном вскармливании, применение Гельминтокса возможно в случае необходимости после консультации с врачом.

### **Способ применения и дозы**

Препарат можно принимать в любое время, нет необходимости в приеме препарата натощак и в предыдущем применении слабительных средств.

#### Энтеробиоз и аскаридоз.

При лечении энтеробиоза и аскаридоза обычно дозировка составляет от 10 мг/кг до 12 мг/кг однократно.

*Детям:* 1 мерная ложка на 10 кг массы тела однократно.

*Взрослым с массой тела менее 75 кг:* 6 мерных ложек (15 мл суспензии) однократно.

*Взрослым с массой тела более 75 кг:* 8 мерных ложек (20 мл суспензии) однократно.

В случае энтеробиоза для полного избавления от паразитов необходимо придерживаться строгих гигиенических мероприятий и лечить всех членов семьи одновременно. Во избежание повторного самозаражения необходимо принять повторную дозу через 3 недели после первого применения препарата.

#### Анкилостомоз.

В эндемичных районах в случае заражения *Necator americanus* или массивной инвазии *Ancylostoma duodenale* дозировка составляет 20 мг/кг в сутки (за 1 или 2 приема) в течение 2-3 дней.

*Детям:* 2 мерные ложки на 10 кг массы тела в сутки.

*Взрослым с массой тела менее 75 кг:* 12 мерных ложек (30 мл суспензии) в сутки.

*Взрослым с массой тела более 75 кг:* 16 мерных ложек (40 мл суспензии) в сутки.

В случае умеренного заражения *Ancylostoma duodenale* (обычно наблюдается в эндемичных районах) может быть достаточно приема 10 мг/кг однократно.

Взрослым пациентам целесообразно применять Гельминтокс в форме таблеток, но в случае невозможности приема таблеток рекомендуется применение препарата в виде суспензии.

## **Дети**

Назначать детям с массой тела не менее 10 кг.

## **Передозировка**

Вследствие незначительной абсорбции концентрация в плазме крови низкая. Передозировка, даже большие, вызывают некоторые нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея) и незначительные временные расстройства со стороны центральной нервной системы (астения, головокружение, головная боль). Иногда передозировка приводит к увеличению уровня печеночных трансаминаз (АсАТ). Специфические антидоты неизвестны. Рекомендуется немедленное промывание желудка, а также мониторинг функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Лечение симптоматическое.

## **Побочные реакции**

*Редко:* желудочно-кишечные расстройства (анорексия, тошнота, рвота, боль в животе, диарея), снижение или временное повышение уровня трансаминаз.

В отдельных случаях: головная боль, головокружение, сонливость, бессонница, астения, слабость, повышенная утомляемость, кожные высыпания, крапивница.

Возможны реакции гиперчувствительности.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 15 мл суспензии во флаконе, по 1 флакону с мерной ложкой в картонной коробке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Иннотера Шузи.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Рю Рене Шантер, слякоти-сюр-Сис, Вальюар-сюр-Сис, 41150, Франция.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).